

Atropin und Duboisin
gegen
Nachtschweisse der Phthisiker.

INAUGURAL-ABHANDLUNG
zur Erlangung der Doctorwürde

unter dem Präsidium

des

Herrn Obermedicinalrathes Professors

DR. VON ZIEMSEN

der medicinischen Fakultät zu München

vorgelegt

von

Rudolph Habel

prakt. Arzt aus Neustadt in Ober-Schlesien.

München, 1881.

KGL. HOF- U. UNIVERSITÄTS-BUCHDRUCKEREI V. DR. C. WOLF & SOHN.

Atropin und Duboisin
gegen
Nachtschweisse der Phthisiker.

INAUGURAL-ABHANDLUNG
zur Erlangung der Doctorwürde

unter dem Präsidium

des

Herrn Obermedicinalrathes Professors

DR. VON ZIEMSEN

der medicinischen Fakultät zu München

vorgelegt

von

Rudolph Habel

prakt. Arzt aus Neustadt in Ober-Schlesien.

München, 1881.

KGL. HOF- U. UNIVERSITAETS-BUCHDRUCKEREI V. DR. C. WOLF & SOHN.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Schon seit langen Zeiten war das Bestreben der Aerzte darauf gerichtet, ein energisch wirkendes Mittel gegen die lästigen Nachtschweisse der Phthitiker zu finden; Vorschläge der verschiedensten Art wurden gemacht. Wie unwirksam jedoch die vorgeschlagenen Mittel gewesen sein müssen und noch sind, geht schon daraus hervor, daß die Zahl derselben unendlich groß ist. Die beliebtesten und noch am meisten Beachtung verdienenden waren kalte Waschungen, theils mit bloßem Wasser, theils mit adstringirenden Mitteln veretzt, anderseits wurden heiße Waschungen fogar vorgeschlagen, ferner kohlenfaures Natron mit Schwefelblumen, gerbfaures Chinin, Resina agarici albi, Schwefelsäure mit Opium, Gerbsäure mit Morphinum, Cascarilla mit Chinin, Hyoscyamus und Digitalis, Cannabis mit Gerbsäure, Salbeiaufgufs, Kataplasmen von Weizen- und Leinmehl mit Acidum pyrogallicum, Brehmer empfahl kurz vor dem Schlafengehen ein Glas Milch mit Cognac etc. etc.

Doch keines all' dieser Mittel, uneingedenk der unzähligen Hausmittel, die mit einem gewissen Mysticismus vom Volke umgeben werden, konnte sich eines allgemeinen Rufes erfreuen und gewissermaßen als souveränes Mittel gegen profuse Schweisssecretion betrachtet werden. Denn vereinzelt schaffte bald dieses, bald jenes Besserung, meist aber ohne constante Wirkung. Da tauchte plötzlich Atropin auf als therapeutisches Mittel gegen profuse Schweissabsonderung überhaupt und gegen phthisische Schweisse insbesondere. Verschiedene Vorsteher von Kranken-

häufeln versuchten das Atropin besonders gegen phthifische Schweisse und von allen Seiten ertönte das allgemeinste Lob, nun sei endlich ein Mittel von ziemlich allgemeiner und constanter Wirkung gefunden. Wie jedoch das Atropin gegen die profusen Schweisse wirke, darüber läßt sich etwas absolut Genaues nicht angeben. Fräntzel ¹⁾, der Atropin in ausgedehntem Mafse anwandte, meint, es wäre die Wirkung deshalb schwer zu erklären, weil 1) der physiologische Vorgang der Schweifssecretion noch nicht zweifellos festgestellt ist, 2) die Schweisse bei den genannten Krankheiten noch unklarer find, und 3) die Wirkung des Atropin noch nicht vollständig ermittelt ist.

Ohne auf den physiologischen Vorgang der Schweifssecretion, der freilich noch nicht zweifellos feststeht, näher eingehen zu wollen, möchte ich doch die neuerliche Ansicht und Arbeit Luchfingers ²⁾ darüber nicht unerwähnt lassen und daran einige Bemerkungen knüpfen.

Nach Luchfinger laufen Nervenfasern, welche der Schweifssecretion vorstehen, auch im Sympathicus, allerdings sind beim Menschen deutlich cerebrale, resp. spinale Schweifsfasern vorhanden, ja zum weitaus gröfsten Theile. Dafs der Sympathicus Schweifsfasern enthalte, gehe unter anderem auch aus der klinischen Beobachtung von Sympathicus-Lähmung ³⁾ hervor, welche Schwitzen auf der Seite der Lähmung erzeuge; doch sei diese Lähmung nur als eine Praedisposition aufzufassen, zu der erst eine centrale Erregung hinzukommen mufs. Dies praedisponirende Moment sei aber die gleichlaufende Aenderung der Gefäfsweite. Obwohl die Drüsen der Haut offenbar bedeutenden Temperaturschwankungen ausgesetzt seien, mit der Erhöhung der Temperatur aber auch eine erhöhte Erregbarkeit der Drüsen einhergehe, so steige doch unter normalen Verhältnissen die Erregbarkeit der

¹⁾ Virch. Arch. LVIII. I. p. 120. 1873.

²⁾ Neue Beiträge zur Physiologie der Schweifssecretion. Pflüger's Arch. XXII. p. 126.

³⁾ Nicati. Differt. Zürich 1873.

Drüsen nur bis zu ihrem optimum nach Luchfinger. Bei Sympathicuslähmung hingegen treten zwei die Erregbarkeit bedeutend erhöhende Momente hinzu, 1) die durch die Erschlaffung der kleinen Arterien beschleunigte Circulation und damit locale Temperaturerhöhung, und 2) die durch denselben Vorgang erzeugte Hyperaemie. Daher sei bei der klinischen Sympathicuslähmung nach Nicati im Stadium der Hyperaemie, d. h. der Gefäßereschlaffung Hyperidrosis, im zweiten Stadium, dem der Anaemie, d. h. der der Lähmung nachfolgenden Contractur der Gefäße, Anidrosis vorhanden, wozu noch der Ausfall jener im Sympathicus gelegenen Schweißsafern komme. Die Anidrosis sei also zum weitaus größten Theile nur auf eine durch die Anaemie bedingte, tief gefunkene Erregbarkeit der Drüsen zurückzuführen, so daß selbst die stärkste centrale Erregung nur schwache oder gar keine Secretion erzeuge.

Erwägt man nun diese durch die Erfahrung und durch das Experiment bestätigten Thatfachen, so liegt es nahe, bei den profusen Schweißsen in Krankheiten und Schwächezuständen an ähnliche Verhältnisse zu denken. Fräntzel führt auch direct die krankhaften und bei schlecht genährten, verkommenen Individuen nach kleinen Körperanstrengungen eintretenden Schweißse auf eine Erschlaffung der Wandungen der peripheren zu den Schweißsdrüsen ziehenden Gefäße zurück, doch ohne es näher zu begründen und auszuführen.

Bekannt ist, daß in den fogen. Consumptionskrankheiten und vorzugsweise bei der Phthise der Tonus der Gefäße vermindert ist und daß die Pulsfrequenz steigt. Die Erschlaffung der peripheren Gefäßwandungen aber bedingt außer Hyperaemie auch noch vermehrte Geschwindigkeit in dem betreffenden Gebiete, die vielleicht in diesem Falle durch die vermehrte Herzaction noch gesteigert wird. Treten diese beiden Momente, was doch anzunehmen ist, bei den Schweißsdrüsen in Kraft, dann sind ähnliche Verhältnisse vorhanden, wie bei Sympathicuslähmung, 1) Hypæraemie und 2) durch die beschleunigte Circulation locale

Temperaturerhöhung, beides Folge der Erschlaffung der Gefäßwandungen, nur dafs hier ausserdem noch die im Sympathicus verlaufenden Schweifsfaern intact find. Beide Momente aber bedingen bis ad optimum gesteigerte Erregbarkeit der Drüsen. Nun kommt als drittes und wichtiges Moment noch hinzu die „reizbare Schwäche“ des Centralnervensystems, die mit diesen Krankheiten einhergeht. Was Wunder also, wenn durch all' diese Faktoren, bis ad optimum gesteigerte Erregbarkeit der Drüsen von Seiten der Circulation und gesteigerte Erregbarkeit der nervösen Elemente, resp. Bahnen, profuse Schweifssecretion die Folge ist!

Freilich stellt die eben vorgetragene Ansicht nichts dar, als meinerseits einen schwachen Versuch auf Grund bekannter Thatfachen die profuse pathologische Schweifssecretion verständlich zu machen.

Nehmen wir also die eben geschilderten Verhältnisse als erwiesen an, dann ergibt sich die Wirkungsweise des Atropins bei derlei Zuständen leicht. Nach den übereinstimmenden Untersuchungen aller Experimental-Pharmacologen lähmt Atropin in mittlerer Dosis die gangliösen Endapparate des Vagus im Herzen und bewirkt durch Reizung des vasomotorischen Centrums eine Verengerung der peripheren kleineren Arterien. Ferner ist durch vielfache Untersuchungen festgestellt, dafs der Angriffspunkt des Atropin überhaupt immer die peripheren Nervenendigungen resp. die gangliösen Zwischenapparate zwischen Parenchym und Nervenenden sei ¹⁾. Wie Muscarin oder Pilocarpin gerade diese Organe theile in den Zustand höchster Erregung setzen, so lähmt Atropin dieselben Theile, und es besteht zwischen ihnen also ein physiologischer Antagonismus. Von den Chordafasern, die der Speichelsecretion vorstehen, ist durch Kenchel und Heidenhain direct nachgewiesen worden, dafs Atropin dieselben oder vielmehr den

¹⁾ Vergleiche Falk, Antagonismus der Gifte. (Sammlung klinischer Vorträge von Rich. Volkmann, Nr. 159. 1879.)

gangliösen Zwischenapparat zwischen den Endigungen der secretorischen Chordafaern und den Speicheldrüsenzellen lähmt ¹⁾ und dadurch die Salivation aufhebt, wie ja auch schon therapeutisch Atropin gegen Salivation angewendet worden ist. Ebstein ²⁾ theilt einen derartigen Fall mit. Nach Analogie kann man doch sehr wohl annehmen, daß Atropin auch die Endigungen der zu den Schweißdrüsen ziehenden Nerven lähme, wenn es auch bis dato nicht gelang, dies stricte nachzuweisen. Doch liegt eine Analogie der Schweißdrüsen mit den Speicheldrüsen nicht gar so ferne.

Aus diesen theils bewiesenen, theils erschlossenen Wirkungen des Atropin erklärt sich meiner Ansicht nach die Schweißverminderung oder selbst — Aufhebung vollkommen zwanglos. Die durch erhöhte locale Temperatur in Folge beschleunigter Circulation und durch Hyperaemie, beides hervorgegangen aus Erschlaffung der peripheren Gefäßwandungen, hervorgerufene erhöhte Erregbarkeit der Schweißdrüsen wird durch die Verengerung der peripheren kleineren Arterien, die das Atropin bewirkt, und dadurch verlangsamte Circulation und verminderten Blutzufuß bedeutend herabgedrückt; dazu kommt als wichtigstes Moment noch eine Lähmung der nervösen Endapparate der Drüsen nach Analogie der secretorischen Chordalähmung. Alle drei Momente also, die die Schweißsecretion beförderten, 1) Hyperaemie, 2) durch beschleunigte Circulation hervorgerufene locale Temperaturerhöhung, 3) erhöhte nervöse Erregbarkeit, was wir alles zum Zustandekommen der profusen Schweißsecretion annahmen, werden durch die Wirkungen des Atropin in's Gegentheil verkehrt. 1) Die Hyperaemie macht einer verminderten Blutzufuhr Platz, 2) die beschleunigte Circulation wird durch die Verengerung der kleineren Arterien vermindert, 3) die nervöse Leitung vom Centrum wird durch die Lähmung der peripheren Nervenendigungen er-

¹⁾ Nothnagel, Arzneimittellehre, p. 660. 1878.

²⁾ Berliner klinische Wochenschrift, IX, 25. 1873.

schwert oder ganz ausgeschaltet. Ob sich freilich alles in Wirklichkeit so verhält, bleibe dahingestellt, jedoch erscheint mir diese Erklärung am annehmbarsten, weil eben alles sich auf eine einheitliche Basis zurückführen läßt, und vieles davon an anderen Gebilden direct erwiesen ist. Auf die gleiche Weise ist wohl die Verminderung auch anderer secretorischer Auscheidungen, die durch Atropin bewirkt wird, zu erklären.

Was die therapeutische Verwendung des Atropin gegen profuse pathologische Schweisssecretion anbetrifft, so scheint zuerst Da Costa in Pennsylvania Hospital im Winter 1870 davon gegen die phthisischen Nachtschweisse Gebrauch gemacht zu haben.¹⁾ Doch eine nähere Schilderung und ausführlichere Mittheilung über die mit Atropin von Da Costa behandelten Fälle gibt erst Dr. J. C. Wilfon.²⁾ Es wurden 5 phthisische Erkrankungen mit Atropin behandelt. 1—2mal täglich erhielten die Patienten 0,001 Atrop. sulfur. In allen Fällen wurde schnell erhebliche Verminderung der Schweisse erzielt, und Nebenerscheinungen traten nur in geringer Intensität auf. Daran schließt sich eine Mittheilung von Sidney Ringer³⁾, der auch bei einseitigen und örtlichen Schweissen, so wie bei dem habituellen Schwitzen der Kinder von Bella donna haltigen Einreibungen gute Erfolge sah.

Professor Pribram⁴⁾ in Prag wandte ebenfalls in 5 Fällen von Lungenfchwindsucht Atropin an und zwar in Pulverform, und will bei den profusesten Schweissen constant erhebliche Verminderung und nach längerer Anwendung constant gänzlichliches Ausbleiben derselben beobachtet haben ohne erhebliche Nebenerscheinungen.

Doch waren all' die beobachteten Fälle an Zahl zu klein, um ein allgemeineres Urtheil über die günstige Wirkung des

¹⁾ Philad. med. Times I 10. p. 176. 1871.

²⁾ Philad. med. Times III 51. p. 34. 1872.

³⁾ The Practitioner Aug. 1872.

⁴⁾ Böhm. ärztl. Corr. Bl. I 2. 1873.

Atropin sich zu bilden. Da veröffentlichte Dr. Fräntzel¹⁾ 75 mit Atropin behandelte Fälle von profuser pathologischer Schweisssecretion, die auf das genaueste beobachtet worden waren. Um nicht einseitig zu sein, hat vorgenannter Autor ausser bei Phthise, welche allerdings das grösste Contingent stellte, Atropin auch gegen die profusen Schweisse nach acutem Gelenkrheumatismus, im Reconvalescenzstadium der Trichinose und zweimal bei ulceröser Endocarditis angewendet. Nach den damit gemachten Erfahrungen kann Fräntzel das Mittel nur dringend empfehlen.

Es dürfte wohl angezeigt sein, etwas näher seine mit Atropin erzielten Resultate zu betrachten. Im Ganzen brauchte Frantzel Atropin bei 63 Phthisen, 8 Gelenkrheumatismen, 2 ulcerösen Endocarditiden, und 2 Reconvalescenten an Trichinose. Von den 63 Phthisikern waren 15 Fälle mit mehr weniger frischen käfigen Pneumonien, alle mehr weniger fiebernd. Von diesen 15 Fällen hörte nach Atropingebrauch bei 6 die Schweisssecretion ganz auf, bei 7 trat erhebliche Verminderung derselben ein und nur bei 2 Fällen war gar kein Nutzen zu constatiren. Von den weiteren 48 Fällen mehr chronischer, aber ausgesprochener Phthise, von denen bei 42 Fieber vorhanden, blieb Atropingebrauch nur in 5 Fällen ganz ohne jeglichen Erfolg, es waren dies alles Fälle, welche bald darauf starben. Bei weiteren 21 Fällen trat erhebliche Verminderung der Nachtschweisse ein, und bei 22 Fällen verschwanden die Schweisse ganz und gar. Unter all' diesen phthisischen Fällen wurde an 8 Fällen die Beobachtung gemacht, dass nach Gebrauch des Atropin die Schweisse zwar völlig verschwanden, aber nach Aussetzen des Mittels sofort wiederkehrten, um bei Wiedergebrauch des Atropin wieder zu verschwinden. Gerade diese Fälle hält Fräntzel für direct beweisend, dass die Schweisse nicht zufällig schwanden, sondern nur unter directer Einwirkung des Atropin. Von den 8 Fällen von acutem Gelenkrheumatismus erzielte er fünfmal völliges Aufhören, zweimal

¹⁾ Virch. Arch. LVIII 1. p. 120. 1873 und Charité-Annal. I p. 374. 1874.

Nachlaß der Schweisse, nur einmal blieb alle Wirkung aus; bei den 2 Fällen von Endocarditis ulcerosa blieb Atropin nutzlos; bei den 2 Reconvalescenten an Trichinose verschwanden die Schweisse nach kurzer Zeit und blieben für immer aus. Bei dieser grossen Anzahl sorgfältig beobachteter Fälle sah Fräntzel niemals einen andern Nachtheil von Atropin, als nur höchstens ganz leichte Intoxicationsercheinungen; nur viermal mußte das Mittel wegen profuser Diarrhoen gänzlich ausgesetzt werden.

Weiter veröffentlichte Jof. M. Williamfon¹⁾ anknüpfend an die Beobachtungen der vorher erwähnten Kliniker 16 Fälle von Phthise, die er mit Atropin behandelte. Er gibt an, daß er absichtlich Fälle ausgesucht habe, wo schon wochenlang Schweisse bestanden und allen früher eingegebenen Mitteln Trotz geboten hatten. Von diesen 16 Fällen wurde bei 4 Fällen ein so eclatanter Erfolg erzielt, daß schon nach der zweiten Dosis permanenter noch nach 2 Monaten bestehender Stillstand der Schweisssecretion eintrat. Ferner wurden 4 Patienten zwar von den Schweissen befreit, doch traten nach einiger Zeit dieselben wieder auf. Und in den übrigen 8 Fällen war zum mindesten Verminderung der Schweisssecretion eingetreten. Leider hat Verfasser nicht angegeben, wie weit in den einzelnen Fällen der phthisische Proceß vorgeschritten war. Auch er hatte ausser leichten Intoxicationen keinerlei Nachtheil; nur ein einziger Patient bot eine so enorme Empfänglichkeit für Atropin dar, daß es nothwendigerweise ausgesetzt werden mußte.

An diese Veröffentlichungen der günstigen Wirkung des Atropin gegen profuse Schweisse schlossen sich dann noch die Berichte von 2 Wiener Krankenhäusern vom Jahre 1874 und 1876 an. Der erste Bericht²⁾ von 1874 gibt nur summarisch an, daß die mit Atropin angestellten Versuche gegen die profusen Schweisse bei Intermittens keinen konstanten Effect beobachten ließen. —

¹⁾ Lancet. II 4. July p. 116. 1874.

²⁾ Bericht der k. k. Krankenanstalt Rudolph-Stiftung in Wien, 1874.

Genauer und ausführlicher ist der Bericht des Wiedener Krankenhauses¹⁾ in Wien. Dort wurde Atrop. sulf. bei 45 Lungentuberculösen, 28 M. und 17 W. gegen die übermäßigen Schweisse angewendet. In 12 Fällen trat schon nach der ersten Dosis völliges Aufhören der Nachtschweisse ein; in 15 anderen Fällen konnte nach der ersten Dosis nur Verminderung und erst nach längerem Gebrauche oder verdoppelter Dosis völliges Aufhören constatirt werden; in den noch übrigen 18 Fällen war die Wirkung des Atropin nur vorübergehend, die Schweisse hörten zwar auf oder verminderten sich, doch war die Besserung nicht von Bestand. Eigentliche Vergiftungserscheinungen wurden nicht beobachtet, nur einmal wurde das Mittel wegen lästiger Nebenerscheinungen ausgesetzt. Im Anschluß an die Sistirung oder Verminderung der Schweisse wird auch ein scheinbarer Nachlaß wenigstens der quälendsten Symptome des Hustens wahrgenommen und Pulsverlangsamung.

Soweit bisher die Veröffentlichungen über die Wirkung des Atropin gegen profuse Schweisse. Ehe ich auf eine kritische Würdigung dieser Beobachtungen und daraus zu entnehmender Indicationen eingehe, sei es mir erlaubt, hier einige Fälle von Atropinbehandlung aus dem hiesigen Münchener Krankenhause I/I. med. Abtheil., welches Material mir durch die Güte des Herrn Director von Ziemssen zur Verfügung gestellt wurde, kurz anzuführen:

1) Schöneich Jos., Maler, 22 J. Beide Lungen spitzen ergriffen mit Cavernen in denselben. Mäßiges Fieber, bedeutende Macies und Anaemie. Patient erhielt am 23./III. gegen die lästigen profusen Nachtschweisse Atropinpillen. Am nächsten Tage war der Schweiß prompt verschwunden und blieb auch völlig aus bis zu seiner Entlassung, den 30./III.

2) Hutter Georg, Bräuer, 41 J. Phthisis incipiens, fieber-

¹⁾ Bericht der IV. med. Abtheil. des k. k. Krankenhauses Wieden v. 1876. Wien.

los, starke Nachtschweißse. Am 9./VIII. wurde Atropin verordnet, worauf die Schweißse prompt verschwanden und bis zu seiner Entlassung am 12./IX. nicht wieder eintraten.

3) Heifs Leonh., Metzger, 42 J. Beide Spitzen ergriffen, linksseitige exsudative Pleuritis, geringes Fieber, welches bald ganz nachliefs. Am 26./VII. gegen heftige Schweißse Atropin. Vom nächsten Tage an blieben die Schweißse gänzlich weg bis zu seiner Entlassung am 25./VIII.

4) Riedel Georg, Schneider, 26 J. Phthis. incip., hohes Fieber wegen gleichzeitiger heftiger Angina. Am 24./II. Atropin gegen die Nachtschweißse, die seit dem nächsten Tage sistirten. Am 9./III. gebessert entlassen.

5) Schreiber Anna, 63 J., seit 12 Jahren an Husten leidend. Linke Spitze cirrhotisch eingezogen, rechte Spitze einfach gedämpft. Fieberlos. Patientin erhielt vom 21./II. an Atropin gegen die Nachtschweißse, welche geringer wurden und vom 23./II. völlig verschwanden.

6) Waindinger Georg, Bräuer, 27 J. Beide Spitzen ergriffen, die rechte etwas intensiver. Ziemlich hohes Fieber bei seinem Eintritte, das jedoch nach einigen Wochen herunterging. Am 25./II. erhielt Patient Atropin (0,001) gegen die nächtlichen Nachtschweißse ordinirt; an den beiden darauffolgenden Tagen war der Schweiß bedeutend vermindert. Am 27./II. Abends wurde ihm wegen der guten Wirkung 0,0015 Atrop. sulf. gegeben, um den Schweiß ganz zum Verschwinden zu bringen. Doch trat am 28./II. trotz der verstärkten Gabe vermehrte Schweißsecretion auf. Auf die Wiederholung derselben Gabe war am folgenden Morgen der Schweiß verringert, und am 29./II. völlig verschwunden. Doch mußte wegen Appetitstörung das Atropin ausgesetzt werden. In Folge dessen trat am 2./III. wieder Schweiß auf, wenn auch verringert gegen früher und blieb unter Schwankungen seiner Intensität, da auch nebenbei gegen das Fieber starke Salicyldosen gereicht wurden, bestehen, bis das Salicylf. Natr. ausgesetzt wurde. Nach dieser Zeit, vom 8./III. an auf erneute

Darreichung von Atropin, verschwand jede Spur von Schweifs, und so blieb es bis zu seiner Entlassung am 21./III.

7) Eschenloher Ign., Lampist, 25 J. Besonders rechter Oberlappen ergriffen mit Cavernenbildung, linke Spitze nur gering infiltrirt. Mäßiges Fieber, ziemliche Macies. Sehr bedeutende Nachtschweisse. Am 2./III. wurde dagegen Atropin verordnet. In der Nacht darauf kein Schweifs, in den nächsten Tagen sehr wenig Schweifs. Am 6./III. wurde wegen Diarrhöen Atropin ausgesetzt, daher am 7./III. bedeutender Schweifs. Am selben Abend wurde Atropin wieder verabreicht und in den nächsten 2 Tagen war jede Spur von Schweifs verschwunden, doch zwangen leider wieder auftretende Diarrhöen am 9./III. zur Aussetzung des Atropin und erst am 11./III. wurde es von neuem gereicht, in Folge dessen vom 13./III. an jeder Schweifs wieder völlig verschwand. Zwar traten in geringem Maße Schweisse noch zweimal auf, doch sind dieselben auf die gleichzeitige Darreichung großer Dosen Salicylf. Natron gegen eine plötzlich eingetretene Temperatursteigerung zurückzuführen. Denn nach dem Aussetzen des Natr. salicyl. hörten auch diese periodischen Schweisse gänzlich auf und trat nie wieder Schweifs auf bis zu seiner Entlassung am 22./V., also über 2 Monate hinaus.

8) Dietrich Joh., Schuhmacher, 32 J. Beträchtliche Infiltration beider Oberlappen, besonders des rechten. Ziemlich hohes Fieber, welches jedoch nach zweckmäßiger Behandlung nachliefs, ziemliche Macies. Gegen die Nachtschweisse erhielt Patient am 13./XI. Atropin; dieselben verschwanden, traten jedoch nach Aussetzen des Atropin wieder etwas auf, wenn auch bedeutend vermindert. Zu dieser Zeit machte gerade auch der phthisische Proceß Fortschritte. Am 24./XI. wurde Atropin repetirt, und vom nächsten Tage waren die Nachtschweisse verschwunden und blieben aus, trotzdem der locale Proceß in der späteren Zeit wieder einen Nachschub machte.

9) Ritzer Carl, Pferdewärter, 20 J. Beide Spitzen gedämpft, rechts mehr als links. Hohes Fieber. Am 26./IX. Atropin

gegen Nachtschweifse. Am 29./IX. wurde Patient fieberfrei. Die Schweifse hatten immer mehr abgenommen und waren vom 3./X. völlig verschwunden. Trotz später eingetretener linksseitiger Pleuritis mit Temperaturerhöhung blieben die Schweifse aus und nur einmal noch trat Nachtschweifs intercurrent auf, um wieder völlig zu verschwinden und auszubleiben bis zu seiner Entlassung am 14./XII., also fast $2\frac{1}{2}$ Monate.

10) Eberhard Franz, Steinmetz, 30 J. Phthisis incip. Ziemlich hohes Fieber, welches nach und nach abnahm. Am 17./IX. Atropin gegen Nachtschweifs. An den folgenden Tagen Schweifs geringer, die Pupillen von mäßiger Weite und guter Reaction. Am 23./IX. waren die Pupillen ad maximum erweitert und wurde Atropin ausgesetzt. Trotzdem blieben vom nächsten Tage an die Schweifse völlig aus.

11) Reiter Marie, Näherin, 20 J. Phthisis incipiens. Fieberlos. Patientin bekam am 10./II. Atropin gegen Nachtschweifse, welche darauf geringer wurden und nach 12 Dosen Atropin völlig verschwanden.

12) May L., Schlofser, 25 J. Beide Spitzen stark gedämpft, die linke in höherem Grade als die rechte. Kein Fieber, Nachtschweifse. Am 28./II. Atropin, darauf kein Nachtschweifs, erst am 3./III. trat wieder etwas Schweifs auf, der jedoch vom 4./III. an wieder völlig verschwand, und so blieb es bis zu seiner Entlassung am 20./III.

13) Lautenbacher Marg., Wittwe, 32 J. Beide Spitzen gedämpft. Im linken Oberlappen eine Caverne, mäßiges Fieber, bedeutende Macies. Am 9./II. Atropin gegen die profusen Schweifse. Die Schweifse nahmen ab und verschwanden vom 19./II. ganz, trotzdem der Proceß auf der linken Lunge im Weiterfortschreiten war. Am 5./III. gebessert entlassen.

14) Sperl Jof., Schreinergehülfe, 20 J. Phthisis incip. Kein Fieber. Gegen Nachtschweifse Atropin vom 9./III. an. Da die Schweifse zwar bedeutend abnahmen, doch nicht völlig verschwanden, bekam Patient vom IV. an 2 Stück Pillen, worauf

die Schweisse völlig verschwanden. Trotz der doppelten Gabe außer mittelweiter Pupille keine Nebenerscheinungen.

15) Lehner Bernh., Hausknecht, 39 J. Beide Oberlappen infiltrirt, rechts in höherem Grade mit theilweisem Zerfall, mäßiges Fieber. Am 17./III. wurde gegen die profuse Schweisssecretion Atropin verordnet. Am nächsten Tage verminderte sich der Schweiss, jedoch am 19./III. wieder starke Schweissabfonderung, die nun mit einigem Nachlass in schwankender Intensität bis zu seinem Tode blieb, 5./IV.

16) Wütschner Andr., Schneider, 28 J. Rechte Spitze gedämpft, geringes Fieber, mit starken Nachtschweissen. Dagegen am 23./II. Atropin; am folgenden Tage war wenig Schweiss vorhanden, ebenso am nächsten Tage, Atropin wurde deshalb ausgesetzt; doch zwangen wieder beträchtlich eintretende Schweisse zur Wiederholung des Atropin, worauf wieder beträchtlicher Nachlass derselben erfolgte, ohne jedoch völlig zu schwinden.

17) Völker Franz, Tagelöhner, 46 J. Rechte Spitze gedämpft, rechtsseitige Pleuritis, mäßiges Fieber. Am 24./VIII. Atropin gegen abundante Nachtschweisse. Die Schweisse ließen nach, ohne doch ganz zu verschwinden, namentlich trat gegen Morgen immer noch etwas Schweiss auf. Am 3./IX. waren die Pupillen ziemlich weit mit träger Reaction, darum Atropin ausgesetzt. Doch traten am folgenden Tage wieder starke Nachtschweisse auf, die erst nach erneutem Atropingebrauch wieder bedeutend nachliessen. Sobald jedoch Atropin ausgesetzt wurde, traten die Schweisse in früherer Heftigkeit wieder auf. So mußte am 14./IX. Atropin wieder verabreicht werden, worauf die Schweisse prompt nachliessen, ja zeitweise ganz schwanden. Seit 23./IX. traten profuse Diarrhöen ein, die Patienten ungeheuer schwächten, doch blieben die Nachtschweisse gering oder ganz aus, um am 6./X. wieder stark zu erscheinen. Da auch der phthisische Proceß die linke Lunge ergriff, die Diarrhöen aber nicht sistirten, starb Patient unter zunehmender Schwäche und Benommenheit des Sensoriums am 22./X. Die Schweisse waren in der letzten Zeit

gleichwohl ganz verschwunden. Jedenfalls war die Phthise mit Darmtuberculose complicirt.

18). Sohm Peter, Arbeiter, 37 J. Beide Spitzen afficirt. Mäßiges Fieber, nur hie und da hoch ansteigend. Am 22./VI. Atropin gegen die Nachtschweißse. Die Schweißse wurden geringer, Pupillen waren nicht erweitert. Bei Fortgebrauch des Atropin war die Schweißsecretion bedeutend herabgesetzt worden. Erst am 6./VIII. trat wieder bedeutende Schweißabsonderung auf, die auf Atropin wieder bedeutend nachließ, und so blieb es bis zu seiner Entlassung am 29./VIII.

19). Brunner Xav., Schreinergehülfe, 38 J. Beide Lungen in ihrer ganzen Ausdehnung ziemlich hochgradig ergriffen, mäßiges Fieber, bedeutende Abmagerung. Am 28./VI. Atropin gegen Nachtschweißse, die etwas nachließen. Unter rasch fortschreitendem Zerfall der Lunge und zunehmender Schwäche starb Patient 4 Wochen darauf.

20) Rewitz Christ., Hafner, 26 J. Ganze linke Lunge, vorzugsweise jedoch der Oberlappen ergriffen, rechts nur Spitzeninfiltration. Mäßiges Fieber. Starke Schweißse. Am 5./I. Atropin dagegen, ohne jeden Erfolg in den ersten Tagen; Pupillen sehr weit, es trat Brechneigung und Diarrhöe ein, in Folge dessen blieb Atropin vom 8./I. an weg. Die Pupillen blieben trotzdem noch lange Zeit weit. Erst am 14./I. wurde die Atropinbehandlung wieder aufgenommen, worauf nun die Schweißse geringer wurden. Doch schritt der pathologische Proceß rasch weiter und Patient starb schon am 4./II.

21) Bauer Jos., Metzger, 23 J. Beide Lungenspitzen ergriffen, rechts mehr als links, Darmphthise. Mäßiges Fieber. Gegen die Nachtschweißse wurde am 30./I. mit Atropin vorgegangen, doch ohne sichtlichem Erfolg, auch der locale Proceß machte unterdessen Fortschritte. Erst vom 13./II. konnte ein Geringerwerden der Schweißsecretion constatirt werden. Da jedoch vom 24./II. wieder sehr starke Schweißse auftraten, bekam Patient vom 4./III. wieder Atropin. Am nächsten Tage kein

Schweifs und so die folgenden Tage, bis am 13./III. wieder viel Schweifs auftrat. Am 15./III. wurde von neuem Atropin gegeben, worauf die Schweifse bedeutend verringert wurden, ohne jedoch ganz zu schwinden. Am 22./III. wurde Patient auf seinen Wunsch entlassen.

22) Berner Wendelin, Maler, 25 J. Beide Spitzen ergriffen, besonders links. Etwas Fieber, beträchtliche Nachtschweifse. Am 18./IV. bekam Patient, der auch des Tags viel schwitzt, 2 Atropinpillen (0,0012). Am nächsten Tage war wesentliche Besserung, indem erst morgens mäßiger Schweifs auftrat. Doch klagte Patient über Kopfschmerz, Pupille war mittelweit, gut reagierend. Patient bekam nun nur 1 Atropin-Pille; am nächsten Morgen kein Schweifs, doch klagt Patient über heftigen Unterleibschmerz; Abdomen druckempfindlich, Pupillen ziemlich weit, gut reagierend. Atropin bleibt weg. Am 21./IV. unbedeutender Schweifs. Am 24./IV. wieder heftige Schweifse gegen Morgen und auch am Tage, daher erhielt Patient wieder 1 Atropinpille, welche in den nächsten Tagen wiederholt wurde. Jedoch nur die Nachmittags auftretenden Schweifse blieben aus, während die Nachtschweifse, wenn auch gegen früher verringert, fortbestanden. Am 28./IV. wurde Patient entlassen.

23) Auer Cresc., Tagelöhnerin, 32 J. Beide Spitzen gedämpft, rechts mehr. Ziemliche Macies, hohes Fieber. Am 3./IV. Atropin gegen die Nachtschweifse. Den darauffolgenden Tag war der Schweifs vermindert, unterdeß hatte auch das hohe continuirliche Fieber nachgelassen. Den 5./IV. wieder heftiger Schweifs, ebenso am folgenden Tage, doch nahm er darauf etwas ab, und so blieb es, bis am 16./IV. wieder hohes continuirliches Fieber eintrat mit darauffolgenden heftigen Schweifsen. Auf Atropin verminderten sie sich von Neuem. Am 11./V. erfolgte unter zunehmendem Collaps der Tod.

24) Knoll Max, Schlosser, 39 J. Beide Spitzen ergriffen; die linke stärker als die rechte. Ziemlich hohes Fieber. Am 29./III. wurde Atropin gegen die profusen Nachtschweifse verab

reicht. Doch bestanden Anfangs die Schweisse trotz Atropin fort, erst am 3./IV. wurden sie etwas mässiger, und so blieb es, bis am 17./IV. wieder sehr heftiger Schweiß ausbrach. Auf erneute Darreichung von nur 2 Atropin-Pillen am 20./IV. wurden die Schweisse sehr vermindert; doch war die Pupille stark erweitert, Patient klagte über Flimmern vor den Augen und wollte des Abends undeutlich sehen; etwas Erbrechen. Atropin wurde ausgesetzt. Die Intoxicationsercheinungen gingen zurück und auch die Schweisse blieben vermindert.

25) Kreiner Jos., Köchin, 20 J. Linke Lunge infiltrirt, rechte Spitze gedämpft; hohes Fieber, klagte Anfangs über keinerlei Nachtschweiß; erst später traten geringe Nachtschweisse auf, welche bald heftiger wurden, so dass seit dem 17./IV. Atropin gereicht wurde. Trotz Atropin blieben die Schweisse bedeutend, auch der phthisische Process machte sichtliche Fortschritte. Erst am 27./IV. wurde der Schweiß mässiger, so dass am 28./IV. Atropin ausgesetzt werden konnte. Doch zwangen am 2./V. wieder bedeutend eintretende Schweisse zur erneuten Darreichung des Atropin, welches nun sehr gut wirkte. Theils blieb der Schweiß ganz aus, theils war er bedeutend verringert. Am 20./V. wurde Patientin gebessert entlassen.

26) Klar Moritz, Schneider, 24 J. Beide Spitzen ergriffen. Mässiges Fieber, Nachtschweisse. Am 11./V. Atropin gegen Nachtschweisse, worauf sichtlicher Nachlass derselben erfolgte. Patient wurde am 20./V. gebessert entlassen.

27) Schmidt Carol., Dienstmädchen, 27 J. Phthisis incipiens. Kein Fieber. Gegen starke Nachtschweisse am 26./V. Atropin verabreicht; die Schweisse wurden sichtlich geringer, trotzdem später mässiges Fieber hinzutrat, und blieben auf einer geringen Stufe bis zur Entlassung, 4./VI.

28) Schachtel Marg., Köchin, 37 J. Beide Spitzen ergriffen, rechts sehr weit nach unten reichend mit theilweisem Zerfall, mässiges Fieber, beträchtliche Macies, bedeutende Nachtschweisse. Am 22./II. wurde Atropin verordnet. Erst nach

einigen Tagen trat Nachlaß der bedeutenden Schweifse ein, so daß eine gewisse Euphorie Platz griff.

29) Neunkirchen Emma, Zimmermädchen, 19 J. Phthisis incipiens, kein Fieber. Am 30./IV. erhielt Patientin Atropin gegen Nachtschweifse. Dieselben nahmen bedeutend ab, und auf ein nochmaliges Auftreten wurde von neuem Atropin gereicht mit demselben günstigen Erfolge, ohne jedoch sie gänzlich zum Schwinden zu bringen.

30) Paul Christ., Bildhauer, 39 J. Beide Spitzen afficirt, die rechte in höherem Mafse, Fieber höchst unregelmäßig, zeitweise sehr hoch, starke Nachtschweifse. Am 3./IV. Atropin; den darauffolgenden Tag war der Schweiß geringer, aber diese Wirkung war nur vorübergehend; trotz fortwährender Atropindarreichung selbst in verdoppelter Dosis war ein sichtlicher Erfolg nicht zu constatiren. Später sank Patient in Delirien und starb am 3./VI.

31) Wafer Jos., Schlosser, 31 J. Phthisis incipiens, heftige Bronchitis, mäßiges Fieber. Am 20./XI. Atropin gegen Nachtschweifse. Trotz Atropin blieben die Schweifse unvermindert bestehen. Am 27./XI. klagte jedoch Patient über Schwäche der Augen beim Lesen, indem bald eine leichte Trübung des Gesichtsfeldes und Schwindelgefühl auftreten. Objectiv ist nur conjunctivale Röthung zu constatiren, Pupillen eng, beiderseits gleich. Atropin bleibt weg. Am 29./XI. hatte zwar Patient keine Nachtschweifse, jedoch schon am nächsten Morgen traten dieselben wieder auf.

32) Schrödel Jos., Köchin, 21 J. Beide Spitzen ergriffen, mäßiges Fieber. Am 16./I. Atropin gegen Nachtschweifse, an den beiden folgenden Tagen Nachtschweifse geringer. Jedoch am 21./I. trat wieder viel Schweiß auf, auch des Tags, und Atropin erwies sich nutzlos; der Proceß schritt unter hohem Fieber rapide weiter, und Patientin erlag am 6./IV.

33) Weber Marie, Köchin, 25 J. Beide Spitzen gedämpft, hohes Fieber, viel Nachtschweifse. Dagegen am 9./X. Atropin. Schweifse ließen an den nächsten Tagen nicht sichtbar

nach, erst am 13./X. war wenig Schweifs vorhanden, am 14./X. gar kein Schweifs. Am 15./X. trat Schweifs wieder auf und nahm die nächsten Tage immer mehr zu, trotzdem das Fieber nachgelassen. Am 20./X. trat ein Collaps ein, worauf am nächsten Tage Patientin ohne Schweifs, der jedoch am 22./X. wieder erschien; nach einem nochmaligen Collaps starb Patientin am 24./X.

34) Beggel Fanny, Köchin, 30 J. Rechte obere Lungen-Lappe infiltrirt, linke nur an der Spitze, ulcera laryngis, rechtsseitige Pleuritis, mäßiges Fieber. Am 22./I. Atropin gegen die äußerst starken Nachtschweisse, ohne Erfolg. Am 14./II. Atropin wiederholt, wieder ohne Erfolg. Patientin starb 2 Monate darauf.

35) Schneider Franz, Steinmetz, 33 J. Linke Spitze gedämpft, linksseitige Pleuritis, geringes Fieber, ulcus laryngis. Am 20./V. Atropin gegen die erst vor Kurzem auftretenden heftigen Nachtschweisse. Die Schweisse nahmen nicht ab. Am 3./VI. kam ein Haemoptoëanfall und am 15./VI. wurde Patient auf Wunsch entlassen.

Betrachten wir vorderhand diese 35 Fälle etwas genauer, so war die Atropinbehandlung bei den ersten 14 Fällen mit vollständigstem Erfolge gekrönt, indem die Schweisse entweder bald nach der ersten oder zweiten Dosis, wie bei den ersten 5 Fällen, prompt verschwanden, um nicht wiederzukehren, oder wie in den übrigen 9 Fällen nach längerer Anwendung, verdoppelter Dosis, wiederholter Darreichung ganz und gar ausblieben. In weiteren 15 Fällen trat erhebliche Verminderung der Schweifssecretion ein und dadurch subjective Erleichterung und nur in 6 Fällen blieb Atropin nutzlos, entweder von vornherein, wie in 3 Fällen (31, 34, 35), oder nach einer Abnahme des Schweissens traten trotz Atropin dieselben in früherer Intensität wieder auf und blieben bestehen. Um ein klareres Bild von der Wirkung des Atropin zu erhalten, ist es nöthig, in den einzelnen Krankenfällen die Intensität und Extensität der localen

Erkrankung, sowie das Allgemeinbefinden zu berücksichtigen. Erst die Betrachtung beider Factoren wird uns Anhaltspunkte an die Hand geben dafür, ob wir in einem speciellen Krankheitsfalle von Atropin viel oder wenig zu erwarten haben werden.

Was die mit Erfolg gekrönten 14 Fälle anlangt, so überzeugt uns schon ein flüchtiger Blick auf die Krankengeschichten, daß fast alle nur wenig vorgeschrittene, einige erst beginnende Phthisen waren, alle aber bis auf 2 derartig, daß der phthifische Process keine nachweisbaren Fortschritte machte, wo also die progressive Natur gar nicht oder nur in höchst geringem Grade vorhanden war, so daß sie gebessert entlassen werden konnten. Unter den 5 Fällen, wo die dauernde Wirkung des Atropin prompt nach der ersten oder zweiten Dosis eintrat, befinden sich 2 beginnende Phthisen, beide fieberlos, denn das Fieber bei Fall 4 ist nur auf die gleichzeitige heftige Angina zu beziehen, wegen deren Patient wahrscheinlich nur in's Krankenhaus eintrat; ferner eine höchst torpid verlaufende Phthise mit dem Character der Cirrhose, ebenfalls fieberlos; eine sehr wenig vorgeschrittene Phthise mit gleichzeitiger exsudativer Pleuritis, auf deren Bestehen wohl das geringe Fieber zu setzen ist, weil es nach einiger Zeit einem fieberlosen Zustande Platz machte, und endlich eine etwas vorgeschrittene Phthise mit mäßigem Fieber. Von den übrigen 9 Fällen waren 3 fieberlos; 3 beginnende Phthisen und nur 3 Fälle etwas vorgeschrittener, wovon 2 mit Cavernen, die andern Fälle Spitzeninfiltrationen, also Fälle mittleren Grades des phthifischen Processes, mit mäßigem Fieber. Von den gebesserten Fällen, wo Atropin nur Verminderung der Schweisssecretion herbeiführte, waren sämmtliche mit Fieber verbunden und meist mehr weniger käfiger Natur. Von den 15 Fällen waren 8 vorgeschrittene Phthisen, von denen auch 5 mit dem Tode endeten; 5 Fälle waren Spitzeninfiltrationen von geringerer oder größerer Ausdehnung und nur 2 beginnende Phthisen. 2 Fälle waren außerdem mit Darmtuberculose complicirt, von denen einer tödtlich verlief. Von den 6 Fällen, die ohne sicht-

lichen Erfolg mit Atropin behandelt wurden, waren 4 Fälle mehr weniger akut käfiger Natur, sämmtlich mit tödtlichem Ausgange, eine beginnende Phthife mit heftiger Bronchitis complicirt, eine Spitzeninfiltration mit gleichzeitiger Pleuritis. Stellen wir noch einmal die Ergebnisse aller 35 Fälle zusammen.

	mit Erfolg	mit theilweisem Erfolg	ohne Erfolg
Im Ganzen 35 Phthifen	14	15	6
Phthifis incip.	5	2	1
Spitzeninfiltrationen	5	5	1
Vorgeschrittene Phthifen (theilweise käfig)	4	8	4
Ohne Fieber	7	—	—
Mit tödtlichem Ausgange	—	5	4
In Procent	40%	42 $\frac{6}{7}$ %	17 $\frac{1}{2}$ %

Aus dieser Zusammenstellung lassen sich etwa folgende allgemeine Sätze ableiten:

Atropin wirkt gegen die profusen nächtlichen Schweisse der Phthiker am schnellsten und promptesten bei beginnenden Phthifen und bei fieberlosen oder mit nur zeitweise subfebrilen Temperaturen einhergehenden, nicht allzu weit vorgeschrittenen Fällen. In einem etwas vorgeschrittenerem Stadium der Krankheit und mäßig fieberhaftem Zustande läßt sich wohl auch völliger Nachlaß der Schweisssecretion erzielen, jedoch erst

nach längerer Anwendung, verdoppelter Dosis, erneuter Darreichung des Mittels. Vielfach wird man sich aber bei weiter vorgeschrittenen Fällen, besonders vorwiegend käfiger Natur, mit einer erheblichen Verminderung der Schweisse begnügen müssen. Ohne Erfolg ist Atropin bei sehr weit gediehener Zerstörung der Lungen, bei denen meist ein baldiges letales Ende erwartet werden kann, verbunden mit hochgradigem Marasmus.

Nur hie und da findet sich ein frischerer Fall, wo Atropin selbst in diesem frühen Stadium wirkungslos bleibt. Interessant ist die aus der Natur des phthisischen Processes gezogene Beobachtung, daß Atropin bedeutend schneller und dauernder wirkt bei Fällen, wo mehr der chronische Entzündungs- und Infiltrationsprocess ausgesprochen ist, als die käfige Natur und rascher Zerfall.

Vergleichen wir mit unseren Ergebnissen Fräntzel's Zahlen: Von 63 Phthisikern wurden 28 gänzlich von Schweissen befreit, bei 28 trat Verminderung derselben ein und nur bei 7 blieb Atropin völlig nutzlos; in $\%$ ausgedrückt: Mit Erfolg $44\frac{4}{9}\%$, mit theilweisem Erfolg $44\frac{4}{9}\%$, ohne Erfolg $11\frac{1}{9}\%$. Nach unserer Zusammenstellung war: mit Erfolg 40% , mit theilweisem Erfolg $42\frac{6}{7}\%$, ohne Erfolg $17\frac{1}{7}\%$. Im allgemeinen sind also unsere Zahlen ziemlich übereinstimmend mit denen Fräntzel's; nur überwiegen die ohne Erfolg behandelten Fälle um etwas die Zahl Fräntzel's, was wohl daher kommen mag, daß unter die Rubrik ohne Erfolg auch die Fälle gezählt wurden, wo zwar ein vorübergehender, aber inconstanter Erfolg erzielt worden. Auch unsere aus den Ergebnissen gezogenen allgemeinen Sätze sind in nuce auch im Berichte Fräntzel's enthalten. Auch hier waren die erfolglosen Fälle sehr vorgeschrittene, welche bald darauf starben, und auch er erwähnte, daß in einigen Fällen (8) nach Aussetzen des Atropin die prompt verschwundenen Schweisse wieder erschienen, um einem nochmaligen Angriff des Atropin zu weichen, eine Beobachtung, die mit der unserigen voll übereinstimmt.

Etwas abweichend sind die aus dem Wiener Krankenhause Wieden gewonnenen Zahlen, doch im Allgemeinen scheinen auch hier die Erfahrungen gleicher Natur zu sein. Speciell wird in dem vorerwähnten Berichte noch bemerkt, daß auf Atropin auch der quälende Husten des Nachts etwas nachgelassen habe. Wir haben zwar diesen Umstand in unseren Krankengeschichten nicht besonders hervorgehoben, als nicht stricte zur Sache gehörig, jedoch nach aufmerksamer Prüfung der Original-Krankengeschichten können wir die Beobachtung, allerdings nur ganz allgemein, bestätigen. Denn ein untrügliches Urtheil darüber wird sich kaum fällen lassen, da ja immer nebenbei auch Narcotica gegen den quälenden Hustenreiz gereicht wurde; nur fanden wir in vielen Fällen, daß nach Aussetzen des Atropin trotz Morphinum der Husten als quälender verzeichnet war, als zur Zeit der Atropin-darreichung. Doch dies nur nebenbei.

Wir haben in der statistischen Zahlenvergleichung vorzugsweise Fräntzel herangezogen, weil dieser Bericht am genauesten und detaillirtesten ist, und die betreffenden Zahlen wie die unfriegen nach gleichen Principien gefunden worden sind. Zur Vervollkommenung seien auch die von den anderen Beobachtern gefundenen Resultate in Zahlen und procentisch zusammengestellt. Im Allgemeinen wird man eine gewisse Uebereinstimmung nicht verkennen.

Siehe Tabelle pag. 25.

Aus den bisher beobachteten und publizirten Fällen geht ferner hervor, daß Atropin in den seltensten Fällen arge Nebenererscheinungen macht. Ganz geringe Nebenererscheinungen werden oft nicht zu vermeiden sein und sind auch ganz ohne jeden Nachtheil, wie Fräntzel es auch ausspricht. Die Nebenererscheinungen, welche theilweise aus der Wirkungsweise des Atropin schon a priori sich erschließen lassen, sind nach den meisten Beobachtungen folgende: Leichte Intoxicationen kündigen sich durch ein Gefühl von Trockenheit und Hitze im Rachen und Kehlkopf an, zu dem sich oft

	Sofortiger Erfolg nach den ersten Dosen.	Erfolg nach län- gerer Anwend- ung.	Theilweiser Erfolg, d. h. Verminder- ung der Schweißse.	Ohne Erfolg.
16 Phthifen nach Jos. M. Williamfon	4	4	8	—
	25 ⁰ / ₀	25 ⁰ / ₀	50 ⁰ / ₀	—
45 Phthifen nach dem Krankenhause Wieden	12	15	18	—
	26 ² / ₃ ⁰ / ₀	33 ¹ / ₃ ⁰ / ₀	40 ⁰ / ₀	—
35 Phthifen nach dem Münchener Krankenhause	5	9	15	6
	14 ² / ₇ ⁰ / ₀	25 ⁵ / ₇ ⁰ / ₀	42 ⁶ / ₇ ⁰ / ₀	17 ¹ / ₇ ⁰ / ₀
63 Phthifen nach Fräntzel	28		28	7
	44 ⁴ / ₉ ⁰ / ₀		44 ⁴ / ₉ ⁰ / ₀	11 ¹ / ₉ ⁰ / ₀

Indisposition zu jeglicher Arbeit, geistiger, wie körperlicher am nächsten Morgen gefellt. Dazu kommt häufig eine mäfsige Erweiterung der Pupille, Klagen über leichten Schwindel und Unvermögen, kleine Schrift, besonders wenn es zu dunkeln anfängt, zu lesen. Stärkere Grade der Intoxication bewirken Kopfschmerz, Uebelkeit, Appetitlosigkeit, Schwäche und Zittern der Glieder, Pupillenweite ad maximum, Hallucinationen, Delirien selbst bis zur acuten Manie sich steigend, wie es bei der therapeutischen Verwendung des Atropin in der Augenheilkunde beobachtet wurde, sind bisher hier niemals gesehen worden. Meist waren, wie erwähnt, die Nebenerscheinungen nur geringer Art, so dafs sie selten

zur gänzlichen Aussetzung des Mittels zwangen. Fräntzel führt außerdem profuse Diarrhöen, die er viermal beobachtete, auf Atropin zurück und setzte deshalb Atropin aus; Williamfon durfte nur in einem Falle, wo hohe Empfänglichkeit für Atropin existierte, daselbe auslassen, und nach dem Berichte des Krankenhauses Wieden trat nur in einem Falle von 45 die Nothwendigkeit heran, von Atropin abzusehen. Bei den im hiesigen Krankenhause angestellten Versuchen ergab sich Folgendes: Etwas Trockenheit im Halbe fühlten wohl mehrere Personen, ebenso war oft mäßige Weite der Pupillen vorhanden, die jedoch auf hell und dunkel gut reagirten. Dies gab aber keinen Grund ab zur Aussetzung des Mittels. Zeitweise ausgesetzt wurde Atropin, um im Bedürfnisfalle wieder gebraucht zu werden: einmal wegen Appetitstörung und Uebelkeit; einmal wegen Diarrhöe, welcher Fall besonders dadurch interessant ist, daß jedesmal nach dem Aussetzen des Atropin der Schweiß in voller Stärke wiederkehrte, nach einmaliger erneuter Dosis jedoch prompt wieder verschwand; ferner zweimal, weil die Pupille ad maximum erweitert war; einmal wegen Brechneigung und Diarrhöen; einmal wegen Kopfschmerz und darauffolgenden Unterleibschmerz, ob letzterer jedoch vom Atropin herrühre, bleibe dahin gestellt; einmal, weil die Pupille stark erweitert war, und Patient über Flimmern vor den Augen klagte, auch etwas erbrach; endlich einmal, weil Patient über Schwäche beim Lefen, die er als leichte Trübung des Gesichtsfeldes empfand, und Schwindelgefühl sich beklagte, wo freilich objectiv nur conjunctivale Röthe und dabei enge Pupillen gefunden wurden. Es hätte nach dieser Aufzählung allerdings den Anschein, als ob auf hiesiger Klinik das Atropin öfter ausgesetzt worden wäre, als anderwärts. Dies ist keineswegs der Fall. In den oben angeführten Fällen von Fräntzel etc. mußte gänzlich vom Mittel abgesehen werden, während hier das Atropin meist nur zeitweilig ausgesetzt wurde, um nach Bedarf von neuem gebraucht zu werden. Doch glaubte ich, diese Fälle meist zeitweiliger Unterbrechung anführen zu sollen, um daraus

Schlüsse zu ziehen für eine etwaige Contraindication. Denn meiner Auffassung nach contraindiciren all' die aufgeführten Erscheinungen nur den vorläufigen Weitergebrauch des Atropin; erst wenn sie nach jedesmaliger Darreichung des Atropin immer wieder und in der alten Stärke erscheinen, müßte man ganz von Atropin absehen. Die schwereren Intoxicationsercheinungen dagegen, wie hochgradige Schwäche und Zittern der Glieder, sehr heftiges Erbrechen, profuse Diarrhöen, äußerst heftiger Kopfschmerz mit Schwindel, ja Hallucinationen, Delirien, maniacalische Anfälle, (letztere drei bisher noch nicht beobachtet), erheischen die größte Vorsicht im Weitergebrauch des Atropin, zum mindesten müßte man auf eine längere Zeit das Mittel aussetzen und dann mit den kleinsten Dosen wieder anfangen, um zu sehen, ob der Organismus nun das Atropin besser ertrage. Würden sich auch nach der verringerten Dose den zuletzt genannten ähnliche, wenn auch nicht so klar ausgeprägte, Zufälle einstellen, dann dürfte es wohl gerathener sein, für immer von Atropin abzusehen, weil man sonst leicht mehr schaden als durch Verminderung der Schweißse nützen könnte. Eine mäßig weite Pupille, die noch ziemlich reactionsfähig ist, sowie etwas Trockenheit im Halße contraindiciren Atropin auch zeitweilig keineswegs. Es ist nämlich die Erfahrung gemacht worden, daß nach längerer Anwendung des Mittels auch die anfangs etwas lästige Trockenheit im Halße sich gänzlich verliert oder wenigstens keinerlei subjectiven Beschwerden mehr macht.

Weniger betont, als diese zeitweiligen Contraindicationen, die sich schließlich von selbst ergeben, sind die eigentlichen allgemeinen Indicationen für Atropingebrauch. Es sei mir deshalb erlaubt, aus den schon oben ausgezogenen allgemeinen Sätzen einige allgemeine Indicationen zu folgern.

Indicirt ist Atropin gegen profuse Schweißsecretion der Phthiker in allen Fällen und unter allen Umständen bei beginnenden Phthisen und fieberlosen oder wenigstens nicht continuirlich fiebernden zwar ausgesprochenen, aber mehr weniger chronisch verlaufenden Phthisen mittleren Grades, welche wir im Vorher-

gehenden mit Spitzeninfiltrationen bezeichneten; ferner bei allen torpid verlaufenden, d. h. cirrhotischen Lungenprocessen. Wählt man folch geeignete Fälle zur Atropinbehandlung aus, so wird man fast in allen Fällen einen guten Erfolg erzielen, d. h. vollständiges Aufhören der Schweisssecretion. Dafs freilich auch hier das alte Sprüchwort „Keine Regel ohne Ausnahme“ Recht behält, bedarf keiner weiteren Erörterung. Bei weiter vorgeschrittenen und meist mit mehr weniger hohen Temperaturen einhergehenden Phthisen oder Phthifsen mit vorwiegend käsigem Character lohnt es sich jedenfalls des Versuches; vielfach wird man zum mindesten Verminderung der profusen Schweisse und daher Erleichterung verschaffen, was ja auch schon viel werth ist. Pribram stellt freilich Lungenerkrankung höheren Grades als Contraindication auf. Diesen Satz möchte ich in so ferne etwas einschränken, dafs man doch auch in hochgradigen Fällen den Versuch einmal wagen und nur von solchen Fällen von Lungenerkrankung wenig oder nichts sich versprechen darf, die eine letale Prognose in kurzer Zeit darbieten und mit grosser Schwäche, Hinfälligkeit und Marasmus verbunden sind. Bei derartigen Fällen ist es wohl gerathener, das Atropin bei Seite zu lassen, da leicht etwaige Nebenerscheinungen einen Collaps herbeiführen könnten. Grosse Vorsicht im Gebrauche erheischend und unter Umständen selbst eine stricte Contraindication bildend ist die Complication der Phthise mit einer Herzaffectio, wie schon Pribram es ganz allgemein angab; sei es, dafs die Erkrankung des Herzens im Herzfleische selbst oder im Klappenapparate ihren Sitz hat. Diesen Herzaffectioen im Allgemeinen möchte ich noch etwas drittes hinzufügen, nämlich Behinderung der Herzthätigkeit durch mechanische Momente und Lageveränderungen des Herzens selbst, z. B. Pericarditis, Verwachsung des Herzens mit dem Herzbeutel, grosses linksseitiges Pleuraexsudat mit Verschiebung des Herzens nach rechts etc. Denn Atropin lähmt die gangliösen Endapparate des Vagus im Herzen und steigert die Erregbarkeit des respiratorischen Centrums.

Was die Form anlangt, in welcher Atropin dargereicht wird, so ist ausschließlich das schwefelsaure Salz des Atropin in Anwendung, wie das reine Alcaloid. Irrelevant ist es, ob man Atrop. sulfur. in Lösung, Pulvern oder Pillen darreicht. Im Wiener Krankenhause Wieden wurde folgende Lösung gebraucht: Atrop. sulfur. 0,05; Ag. destill. 20,0; Ds. 10—20 Tropfen. Diese Dosis wurde einmal täglich vor Eintritt der Schweisssecretion oder während derselben verabreicht. Pribram verabreichte 0,0006—0,001 Atrop. sulfur. pro dosi in Pulverform. Die meisten andern Beobachter jedoch gaben der Pillenform den Vorzug. Fränzel verschreibt gewöhnlich Atrop. sulfur. 0,006; Argill. oder Extr. Gentian. g. s. ut f. pilul. X; und gibt 1—2 Pillen. Auch im Münchener Krankenhause I./I. wird Atropin fast ausschließlich in Pillenform angewendet zu 0,0006—0,001 pro dosi. Vulpian und Royet¹⁾ führen etwaige Misserfolge in der Anwendung des Atropin gegen pathologische Schweisssecretion direct auf zu kleine Dosen zurück. Beide beginnen zwar mit einer Dosis von 0,0005, doch müßten dann meist 2 Pillen gegeben werden, selbst 3, Hysterische bedürften sogar bis zu 4—5 Pillen. Natürlich dürften die Pillen nicht auf einmal gereicht werden, sondern in Zwischenräumen von 2 Stunden. Die letzte Pille sei 1—2 Stunden vor zu erwartendem Schweisse zu verabfolgen. Auch nach dem Aufhören der Schweisssecretion sei Atropin in beschränkter Dosis fortzugebrauchen etwa 8—10 Tage, und bei etwaiger Recidive beginne man selbstverständlich wieder von vorne. Auch Fothergill²⁾ ist der Ansicht, daß nach zu kleinen Dosen oft Misserfolge zu verzeichnen sind. Er gab bis zu 0,0025 Atrop. sulfur. und sah bei dieser Gabe niemals ein Fehlschlagen.

Aus all' diesen Angaben möchte ich als zweckmässigstes folgendes Verfahren aufstellen: Man gibt Atrop. sulfur. in Pillenform von 0,0006 pro dosi 2 Stunden vor dem Eintreten des

¹⁾ Vulpian: Gaz des hôp. 139 und Royet: Thèse IV 58. Paris.

²⁾ J. Milner Fothergill: Antidrotics Practitioner Dec. 1876. p. 409.

Schweisses; sollte diese Dosis durchaus keine Wirkung haben, so kann man sie je nach Bedarf verdoppeln, selbst verdreifachen, doch so, daß zwischen jeder Pillenverabreichung ein Zeitraum von wenigstens zwei Stunden liegt. Wie weit man in der Verstärkung der Dosis gehen darf, dafür geben uns etwa eintretende Nebenerscheinungen erheblicherer Art einen sicheren Maßstab an die Hand. Hören nach der ersten oder zweiten Dosis die Schweisse ganz auf, so thut man gut, noch einige Tage Atropin weiter zu verabreichen, etwa 3—4 Tage, wohl kaum 8—10 Tage, wie Vulpian und Royet es wollen. Da Hyoscyamin nach den chemischen und experimentellen Untersuchungen so ziemlich gleiche Wirkung wie Atropin hat, so ist es wohl angebracht, zum Pillenconstituens auch etwas Extractum Hyoscyami hinzuzusetzen, etwa: Atrop. fulfur. 0,006; Extr. Hyoscyam. 0,1; Extr. Gent. g. s. ut f. pil. Nr. X. Ds. Abends 1—2 Pillen. Vielleicht würde von dieser Pillenmischung 1 Pille meist genügen, da 2 Schweiss beschränkende Mittel darin enthalten sind; außerdem aber stehen die Präparate von Hyoscyamus niger im Rufe, leicht narcotisch zu wirken; man würde hiermit möglicherweise auch den lästigen Hustenreiz etwas dämpfen.

Duboisin.

In den Jahren 1877 und 1878 wurde ein neues Alcaloid entdeckt, Duboisin genannt, welches nach dem übereinstimmenden Zeugnisse seiner Unterfucher ganz ähnliche Wirkungen entfaltete, wie Atropin. Es lag nun nahe, für Atropin Duboisin eintreten zu lassen, und in der Augenheilkunde geschah es auch in ausgedehntem Mafse. Zur Beschränkung profuser pathologischer Schweisssecretion, an Stelle des Atropin Duboisin practisch therapeutisch verwendet zu haben, wenngleich es schon vor ihm empfohlen worden war, dies Verdienst gebührt Fräntzel. Nach seiner Empfehlung wurden auch auf hiesiger Klinik, II. med. Abtheilung, ausgedehnte Versuche in dieser Richtung mit Duboisin angestellt, welche sich von der letzten Hälfte des Jahres 1879 an erstrecken. Bevor ich jedoch an den eigentlichen Gegenstand, den Gebrauch des Duboisin gegen phthisische Nachtschweisse, herantrete, sei es mir erlaubt, die in der Literatur zerstreuten Angaben über Duboisin in möglichster Kürze hier zusammenzutragen, was wohl in so fern von etwas Interesse sei dürfte, da Duboisin ein durchaus noch neues und in weiteren Kreisen weniger bekanntes Mittel ist.

Duboisin ist das Alcaloid der didynamischen Solanee „Duboisia myoporoides“, welche auf Neusüdwales, Queensland und Neucaledonien heimisch ist und bis zu Baumgröfse heranwächst. Aus den Blättern wird das Alcaloid gewonnen. Der erste Entdecker

der Wirkung der *Duboisia myoporoides* war Dr. L. Bancroft, der im Jahre 1877 einen Extract aus den Blättern herstellte und dessen mydriatischen Effect erkannte. Die erste Mittheilung davon machte er im October deselben Jahres an die Queensland Philosophical Society. Genauer untersucht wurde das neue Mittel von John Tweedy¹⁾ und dessen mydriatische Wirkung voll bekräftigt. Da das Bestreben unserer Zeit darauf gerichtet ist, aus allen als Medicamente dienenden Pflanzenstoffen den wirksamsten Stoff für sich darzustellen, welches Bestreben zur Aufstellung der verschiedenen als Alcaloide bezeichneten Stoffe führte, so ist es erklärlich, daß man auch aus der *Duboisia myop.* das wirksamste Alcaloid darzustellen suchte. Es gelang nun zuerst Holmes und Gerrand²⁾, aus den Blättern dieser Solanee ein gelbliches Alcaloid zu gewinnen, welches in Alcohol, Chloroform, Aether, Benzol und Schwefelkohlenstoff sehr leicht, in Wasser nur im Verhältniß von 1 : 120 löslich ist. Von feinen Salzen gelang es beiden Autoren, das schwefelsaure und bromwasserstoffsaure Salz darzustellen, beide krystallinisch. Das schwefelsaure Salz zeigt dieselben Reactionen wie Atrop. sulfur., nur erweitert es die Pupille energischer. Daran schließt sich die Mittheilung Ringer's³⁾, der ebenfalls das Alcaloid darstellte und es dem Atropin ähnlich wirkend fand. In Folge dieser ganz gleichen Wirkung wurde Duboisin für ein dem Atropin identisches Alcaloid gehalten, bis Ladenburg⁴⁾ durch eine Reihe von chemischen Reactionen nachwies, daß Duboisin keineswegs mit Atropin identisch sei, sondern mit dem Alcaloid von *Hyoscyamus niger*, gleichfalls zur Klasse der Solaneen gehörig, dem Hyoscyamin. Nun ist aber bekannt, daß Hyoscyamin eine dem Atropin sehr ähnliche Wirkung hat, weshalb man ja auch die

¹⁾ Lancet 1878, March, 2. p. 304.

²⁾ Holmes et Gerrand: Le *duboisia myop.* R. Br. et son alcaloide. Bull. de Thér. XCIV S. 360.

³⁾ Journ. de méd. de Bruxelles, Sept. 1878. p. 198.

⁴⁾ Pharmac. Ztg. 1880. XXV, Nr. 20. p. 148.

Alcaloide von *Atropa Belladonna*, *Hyoscyamus niger*, zu denen sich noch *Datura Stramonium* gefellt, ihrer physiologischen Wirkung gemäß in eine Klasse stellt.

Was die speciellen Untersuchungen betreffs der Wirkungsweise des Duboisin anlangt, so ergab sich bis jetzt ein Unterschied von Atropin nur in Bezug auf die Intensität der Wirkung. Die mydriatische Wirkung ist, wie schon oben erwähnt, zuerst von **Bancroft** erkannt und von **Tweedy** näher untersucht worden. Alle Beobachter stimmen darin überein, daß es energischer als Atropin die Pupille erweitert, ja **Marmé**¹⁾ sagt, daß es anscheinend fast zehnmal so stark als Atropin wirke; aber nicht nur energischer, auch bedeutend schneller tritt nach Duboisin Mydriasis ein, sowie auch Accomodationslähmung; dem schnellen Eintreten analog ist die Dauer der Wirkung eine kürzere. Dies bestätigen unter anderm **Wecker**²⁾, **Norris**³⁾, **Landesberg**⁴⁾, **Loison**⁵⁾, **Ringer**⁶⁾, **Risley**⁷⁾, **Seely**⁸⁾ etc. Darum schlugen genannte Autoren auch vor, zu mehr diagnostischen Zwecken besser Duboisin zu verwenden, weil Mydriasis schneller erfolgt, aber auch schneller vergeht. Ebenso sei Duboisin anzuwenden bei Personen, welche eine Idiosyncrasie gegen Atropin befäßen; nach Duboisin folgt eine Conjunctivitis, wie häufig nach Atropin, nicht nach, ja **Landesberg**⁴⁾ ist der Meinung, daß eine Atropin-Conjunctivitis follicul. unter dem Gebrauche von Duboisin rasch verschwinde; auch hält genannter Autor Duboisin bei Accomodationskrampf für vortheilhafter, als Atropin.

¹⁾ Ueber Dubois. myop. R. Br. Gött. Nachr. 12. 6. Juli. S. 113.

²⁾ **Wecker**; Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. S. 216 und Bull. générale de théér. 3 avril 1878.

³⁾ **Norris**: Americ. Journ. of scienc. April 1879.

⁴⁾ **Landesberg**: Philad. med. and surg. Reporter XLI. Nov. 1879.

⁵⁾ **Loison**: Lyon méd. 20. April 1879.

⁶⁾ **Ringer**: Journ. de méd. de Bruxelles Sept. 1878 p. 198.

⁷⁾ **Risley**: Americ. Journ. of the méd. sc. 1880, April, p. 410.

⁸⁾ **Seely**: Arch. f. Augenheilk. VIII. 3 und 4. p. 246. 1879.

Aus allen bisher gemachten Beobachtungen geht jedoch auch hervor, daß nach Duboisin häufig Intoxicationsercheinungen auftreten. Solche Intoxicationen machen sich ähnlich den Atropin-Intoxicationen geltend in Trockenheit, vermehrtem Durstgefühl, Schwindel, Uebelkeit, Somnolenz, Arythmie des Pulfes, ja selbst Hallucinationen und Irrereden. Dahin bezügliche Fälle theilen Seely, Carl¹⁾, Landesberg, Galezowsky²⁾, Norris und Andere mit.

Von Holmes und Gerrand wurde ferner constatirt, daß wäßrige Lösungen von 0,01 subcutan Fröschen injicirt erst nach 2—24 Std. tetanische Krämpfe analog denen des Atropin hervorruft, was von Ringer und William Murrell³⁾ bestätigt wird. Interessant ist eine Vergleichung des Atrop. sulfur. mit Dub. sulfur. in Bezug auf die relativen Effecte, welche Sidney Ringer⁴⁾ anstellte. Nach diesen Untersuchungen stellt sich heraus, was auch die anderen Beobachter hervorheben, daß Duboisin an Intensität der Wirkung bei weitem Atropin übertreffe. So ruft z. B. 0,001 Atropinsulfat nur Trockenheit im Munde hervor, während dieselbe Dosis Duboisinsulfat in 2 Dosen innerhalb 2 Std. verabreicht, Schläfrigkeit und Delirien, Zucken in den Gliedern, Gesichtshallucinationen und Puls- und Athembeschleunigung auf die Dauer von 10 Std. erzeuge. Ferner constatirte Marmé die dem Atropin analoge Wirkung auf Circulation und N. vagus, Erregung der Hirncentra, der Respiration und Temperatur, ferner auf die Darmganglion, den N. splanchnicus und die antagonistische Wirkung gegen Pilocarpin und Morphin.

All' die bisher über Duboisin experimentell gefundenen Erfahrungen bedürfen noch weiterer Bestätigung, jedenfalls sind die Acten über die volle und reine Wirkungsweise noch nicht ge-

¹⁾ Carl: Monatsbl. f. Augenheilk. XVII. p. 337.

²⁾ Galezowski: Gaz. des hôp. p. 1082, 1878 und Soc. de Biol.: Gaz. de Paris, 49, p. 606. 1878.

³⁾ Journ. of Anat. and Phys. 1878. XI. p. 321.

⁴⁾ On the relative action of duboisia and atropia. Pract. Oct. p. 247. 1879.

schlossen. Bei der relativen Seltenheit der Anwendung dürfte wohl auch die gröfsere oder geringere Reinheit des Präparates eine Rolle spielen; denn wie aus Späterem hervorgehen wird, sind bei Anwendung von Duboisin fulfur. folch' heftige Nebenerscheinungen, wie es nach Ringer doch sein müfste, nicht beobachtet worden.

Wegen seiner mydriatischen Wirkung, hauptsächlich in der Augenheilkunde angewendet, wurde es jedoch schon von Holmes und Gerrand und später von Gubler gegen profuse Schweifssecretion empfohlen. Zuerst hatte wohl Ringer die Wirkung des Duboisin gegen Pilocarpinschweisse und Salivation constatirt. Gubler ¹⁾ gibt 0,0005 — 0,001 pro Dosi in subcutaner Injection und empfiehlt Dub. noch weiter gegen gewisse Arten von Delirien, wo das Gehirn hyperaemisch ist und die Pupille verengt. Fräntzel ²⁾, welcher zuerst einen detaillirten Bericht über die therapeutische Anwendung des Duboisin gegen pathologische profuse Schweifssecretion veröffentlichte, wendete dasselbe bei 15 Fällen an, von denen 13 ausgesprochene Phthisen waren und 2 Polyarthritis rheumatica in der Reconvalescenz. Anfangs hatte er, vielleicht nach dem Vorschlage von Halmes und Gerrand Duboisin subcutan den Patienten beigebracht in der Stärke von 0,00025, doch wurde diese Methode so unpopulär auf seiner Klinik, und wurden alle möglichen und unmöglichen Erscheinungen dem Duboisin seitens der Patienten zugeschrieben, dafs er die hypodermatische Art der Darreichung verlassen mußte; denn die Patienten wollten lieber schwitzen, als sich einspritzen lassen. Nun ging er zu Pillenform über und verabreichte Duboisin in folgender Form: Rp.: Duboisin 0,005; Argill. q. s. ut f. pil. Nr. X oder XX Ds. Abends 1 Pille, so dafs also pro dosi 0,0025 — 0,0005 gegeben wurde.

Doch bevor ich näher eingehe auf die Erfolge, die er erzielte, möchte ich erst die mit Duboisin im hiesigen Krankenhause I. I., II. med. Abth., angestellten Versuche veröffentlichen:

¹⁾ Ref. aus Journal de Thérap. Nr. 3. 1880 und L'Union méd. Nr. 74. 1880.

²⁾ Separat-Abdruck aus d. Charité-Annal. VI. Jhrg. 51—6.

1) Döhler Ed., Bäcker, 28 J. Leichte Mitralinsuffizienz, beide Spitzen gedämpft, leichtes Fieber, starke Nachtschweisse. Dagegen wurde am 9./IX. (1879) Duboifin sulfur. gegeben 0,001 p. dosi. Die Schweisse verminderten sich sichtlich vom nächsten Tage an, und vom 12./IX. war aller Schweiß verschwunden. Pupillen nur mäßig erweitert; Patient trat gebessert aus.

2) Dorfner Kath., Kellnerin, 20 J. Beide Lungenspitzen gedämpft, besonders links weit herabreichend, leichtes Fieber, grofse Anaemie. Am 2./XI. wurde gegen die starken Schweisse Duboifin gegeben. Sichtlich nahmen die Schweisse ab und liefsen vom 5./XI. gänzlich nach, nur am 10./XI. trat ein leichter Schweiß auf, wohl zurückzuführen auf eine plötzliche Temperatursteigerung; am 11./XI. war der Schweiß wieder ganz verschwunden. Doch mußte an diesem Tage wegen Magenbeschwerden Duboifin ausgesetzt werden, deshalb trat am 13./XI. wieder etwas Schweiß auf. Auf eine erneute Darreichung von Duboifin wollte jedoch so recht ein sichtlicher Erfolg nicht eintreten, freilich machte zu dieser Zeit gerade der locale Procefs weitere Fortschritte und die Temperatur stieg bis 40,0. Von der Zeit, wo das Fieber abfiel (18./XI.), wurden auch die Schweisse auf Duboifin wieder geringer und hörten zeitweilig ganz auf. Patientin wurde auf Wunsch entlassen, kehrte jedoch bald mit hochgradiger Zerstörung der Lungen zurück und erlag einem Pneumothorax plötzlich am 29./XII.

3) Springer Friedr., Köchin, 31 J. Phthisis incipiens, geringes Fieber, nur zeitweilig hoch. Am 5./XI. wurde gegen die neu aufgetretenen Nachtschweisse Duboifin gegeben. Die Schweisse nahmen bedeutend ab und verloren sich, als entschiedene Besserung ihres Allgemeinbefindens eintrat, gänzlich und blieben auch verschwunden oder traten doch nur sehr leicht auf, selbst als der phthisische Procefs begann mehr acut zu werden und bedeutend um sich zu greifen. Erst am 2./XII. traten Schweisse wieder auf, doch ging es nun so rapide mit der Infiltration und Zerfall der Lungen, dafs Patientin schon am 5./XII. starb.

4) Schmelz Genovefa, Tagelöhnersfrau, 34 J. Beide Oberlappen infiltrirt mit theilweisem Zerfall, Pneumothorax, Febris inverfa. Gegen Nachtschweifse am 30./X. Duboisin verabreicht. Der Schweifs verminderte sich zusehends, und am 5./XI. war Patientin ohne Schweifs, und so blieb es, nur hie und da abwechselnd mit ganz leichtem Schweifs bis zu ihrem durch Pneumothorax am 21./XI. erfolgten Tode.

5) Ehrentreich Friedr., Spulerin, 37 J. Dämpfung beider Spitzen, mäßiges Fieber, hatte Anfangs keine Nachtschweifse. Als solche eintraten, erhielt sie am 2./IX. Duboisin 0,002. Die Schweifse nahmen ab und verschwanden ganz, da auch der phthisische Proceß stillstand und das Fieber gänzlich nachliefs.

6) Nutzinger Mart., Tagelöhner, 42 J. Leichte Dämpfung der rechten Lunge, geringes Fieber. Am 15./VI. (81) Duboisin gegen die Nachtschweifse. Seit dieser Zeit nahmen die Schweifse langsam aber stetig ab und seit einigen Tagen ist Patient völlig frei von Schweifs. Patient noch in Behandlung.

7) Stettemeyer Jos., Photograph, 44 J. Linke Spitze ziemlich weit infiltrirt, geringes Fieber. Am 9./IX. bekam Patient Duboisin gegen die Nachtschweifse, welche darauf stetig abnahmen, trotzdem das Fieber exacerbirte. Erst am 14./IX. trat mit enormer Schwäche vermehrter Schweifs wieder auf und wiederholte sich selbst des Tags; doch dürfte dieser Schweifs wohl auf Rechnung der enormen Schwäche und des Niedergangs des Fiebers von 40,0 auf 37,9 zu setzen sein. Am 16./IX. wurde Duboisin ausgesetzt, doch traten nun am 18. und 19./IX. so beträchtliche Schweifse auf, daß das Hemd zweimal mußte gewechselt werden und Patient thatfächlich in Schweifs gebadet war. Daher bekam er am Abend des 19. wieder Duboisin und zwar 2 Stück Pillen, welche ganz gut ertragen wurden; die Pupillen waren über mittelweit, reagirten aber gut, nur trat etwas später Flimmern vor den Augen ein, besonders beim Versuch zum Lefen. Da die Schweifse abgenommen, wurde Duboisin wegen der Nebenerscheinungen ausgesetzt. Die Schweifse blieben trotzdem vermindert und hörten

vom 23./IX. ganz auf. Patient trat aus, kehrte jedoch bald darauf zurück mit hochgradiger Zerflörung in den Lungen und starb schon am 5./XI.

8) Mayerhofer Elise, Köchin, 25 J. Puerpera, Parametritis. Linker Oberlappen infiltrirt mit Cavernen, etwas weniger der rechte. Rechtsseitige Pleuritis. Hochgradiges Fieber, welches bald sehr unregelmäßig wurde. Am 27./XII. erhielt Patientin Duboisin gegen heftige Nachtschweißse, welche bald allmählig abnahmen und bis auf ein minimum sanken. Am 1./II. wurde Duboisin wieder nöthig und hatte wiederum den guten Erfolg einer beträchtlichen Verminderung der Schweißse. Am 7./II. wurde Patientin gebessert entlassen.

9) Leitl Brig., Hafnerswittwe, 38 J. Beide Spitzen ergriffen mit theilweisem Zerfall, mäßiges Fieber, ziemliche Macies, erhielt am 14./III. gegen Nachtschweißse, über welche sie früher nie geklagt hatte, Duboisin, worauf die Schweißse abnahmen. Am 19./III. kam wieder Schweiß, doch hatte sie höchst unregelmäßiges Fieber, und der locale Proceß machte bedeutende Fortschritte, so daß sie schon am 1./IV. erlag. Die Schweißse waren auf Duboisin wenigstens geringer geworden.

10) Schlegler Kath., Dienstmädchen, 22 J., trat wegen Gastrectasie und Angina follicul. in Behandlung. Bei der Untersuchung wurde Phthisis incip. constatirt. Kein Fieber. Am 6./III. erhielt Patientin, die schon einige Tage über lästige Schweißse geklagt hatte, Duboisin dagegen. Die Schweißse ließen sofort ganz bedeutend nach, ohne jedoch völlig zu verschwinden. Patientin wurde am 9./III. gebessert entlassen. Hätte vielleicht Patientin Duboisin noch etwas länger gebraucht, wären sicher die Schweißse völlig verschwunden.

11) Rabl Ros., Köchin, 18 J. Phthisis incipiens, Anfangs fieberlos, später trat zeitweilig hohes Fieber ein. Am 18./XI. Duboisin gegen Nachtschweißse, wurde am 20./XI. der guten Wirkung wegen ausgesetzt. Doch zwangen wieder auftretende

Schweisse zur erneuten Darreichung des Duboifin am 24./XI. Die Schweisse wurden trotz des hohen Fiebers geringer.

12) Hubeny Innocenz, Kürschnergehülfe, 26 J. Beide Spitzen gedämpft, Carcinoma ventriculi, mäßiges Fieber. Gegen Nachtschweisse am 19./I. Duboifin. Schweisse etwas verringert; erst am 26./I. wieder starker Schweiß, Duboifin repetirt mit theilweisem Erfolg, der locale Lungenproceß machte unterdeß Fortschritte und die Magenerscheinungen traten später in den Vordergrund. Bei zunehmendem Marasmus starb Patient am 15./II.

13) Winkler Johann, Knecht, 54 J. Ziemlich vorgefchrittene Phthife, beiderseitige haemorrhagische Pleuritis, geringes Fieber. Am 22./II. Duboifin gegen Nachtschweisse, welche bedeutend abnahmen, so daß vom 9./III. Duboifin ausgesetzt werden konnte. Die Schweisse blieben äußerst gering. Plötzlich verfiel Patient und starb am 4./IV. Post mortem wurde eine terminale Pneumonie im linken Unterlappen constatirt.

14) Wimmer Cäc., Bäckersfrau, 26 J. Sehr weit vorgefchrittene Phthife mit beträchtlichem Zerfall, Larynxphthife, hohes Fieber. Am 7./VI. Duboifin gegen die bedeutenden Nachtschweisse. Am 8./VI. war Verminderung des Schweißes bis auf ein minimum zwar zu constatiren, doch starb noch am selben Abende Patientin.

15) Schauburger Marie, Blumenmacherin, 21 J. Linke Spitze gedämpft, linksseitige Pleuritis, mäßiges Fieber. Am 1./VI. erhielt Patientin Duboifin gegen die beträchtlichen Nachtschweisse, welche darauf geringer wurden. Am 7./VI. war wieder viel Schweiß. Duboifin repetirt. Der Schweiß nahm sichtlich ab und Patientin wurde am 10./VI. gebeffert entlassen.

16) Rückerl Marie, Wäscherin, 45 J. Beide Lungenspitzen intensiv gedämpft, beträchtliche Macies, mäßiges Fieber, bekam am 23./IV. Duboifin. Die Nachtschweisse wurden geringer und blieben gering bis zu ihrem am 3./VI. erfolgten Tode.

17) Schönhammer Phil., Postoffizialstochter, 46 J. Vor-

geschrittene Phthife. Duboifin schaffte gegen die Nachtschweifse nur geringe Verminderung derselben. Patientin starb bald darauf.

18) Lechner Jof., Korbmacher, 35 J. Beide Spitzen gedämpft, besonders die rechte. Ziemliche Macies, anfänglich kein Fieber, doch später geringe Temperatursteigerungen. Nachtschweifse, Anfangs gering, nahmen an Intensität immer mehr zu. Am 17./XII. dagegen Duboifin. Die Schweifse nahmen beträchtlich ab, Patient schwitzte dann nur noch am Kopfe in Folge der großen Huftenanstrengungen, da auch in letzter Zeit der phthifische Proceß ziemlich acut verlief. Kurze Zeit darauf traten auch bald wieder beträchtlichere Schweifse auf, und es wurde am 28./XII. von neuem Duboifin versucht, doch der nunmehr sehr acut verlaufende Proceß ließ Duboifin nicht mehr voll zur Wirkung kommen. Patient starb am 19./I.

19) Ritzer Matth., Tagelöhner, 30 J. Phthifis incipiens. Ziemlich bedeutendes Fieber. Der Lungenproceß verlief sehr rapide, es war ausgesprochen käfige Pneumonie mit Zerfall. Am 24./XII. wurde Duboifin gegen Nachtschweifse ordinirt. Es trat zwar einige Wirkung ein, indem die Schweifse sich verminderten, doch starb Patient schon einen Monat darauf.

20) Alletsee Matth., Pofamentirgehülfe, 23 J. Rechte Spitze gedämpft, kein Fieber anfänglich. Am 19./I. Duboifin (0,0005). Die Nachtschweifse wurden immer geringer bis minimal, so daß am 25./I. schon Duboifin ausgesetzt werden konnte. Vom 30./I. an war fogar jede Schweifsecretion verschwunden. Doch trat nun plötzlich Temperatursteigerung auf und am 7./II. erschienen wieder starke Schweifse. Sofort wurde Duboifin in der früheren Stärke verabreicht, worauf die Schweifse etwas abnahmen. Am 14./II. waren sie nun wieder bedeutend, besonders an den Füßen. Da sie nun nicht mehr sichtlich auf die frühere Dosis abnahmen, gab man vom 18./II. an 2 Pillen Duboifin, worauf nun die Schweifse wieder sichtlich abnahmen, ohne doch ganz zu verschwinden. Am 25./II. Patient entlassen.

21) Lingauer Joh., Schuhmacher, 42 J. Linke Spitze

gedämpft, anfänglich kein Fieber. Seit 9./II. trat Fieber nach leichtem Frostanfalle ein und objectiv wurde das Ergriffensein der rechten Spitze constatirt. Am 15./II. Duboisin gegen Nachtschweisse. Es trat einiger Nachlass derselben ein, und Patient wurde am 21./II. schon entlassen.

22) Lermann Ferd., Buchdrucker, 25 J. Rechter Oberlappen ergriffen, mässiges Fieber, beträchtliche Macies, sehr bedeutende Schweisssecretion. Gegen letztere am 6./II. Duboisin (0,0005). Die bedeutenden Schweisse wurden beträchtlich vermindert. Als der phthisische Proceß Fortschritte machte, traten die Schweisse wieder bedeutend auf, und deshalb wurden am 19./II. 2 Pillen Duboisin ordinirt. Auch diesmal war wieder Rückgang der Schweisse zu constatiren. Erst am 12./III. traten wieder starke Schweisse auf. Am 27./III. Patient entlassen.

23) Berghammer Xav., Tagelöhner, 35 J. Rechte Spitze gedämpft, hohes Fieber, mässige Macies. Vom 14./II. an 2 Pillen Duboisin gegen profuse Schweisse, welche darauf geringer wurden und so gering blieben bis zu seiner Entlassung am 7./III.

24) Maier Fr., Diener, 30 J. Rechte Spitze gedämpft, mässiges, zeitweise hohes Fieber. Am 21./V. erhielt Patient 2 Pillen Duboisin (0,001), worauf die Schweisse nach und nach geringer wurden und am 4./VI. ganz unbedeutend waren. Erst am 22./VI. trat wieder erhebliche Schweisssecretion ein, vielleicht auf die vorangegangene Temperatursteigerung zurückzuführen, trotzdem daß Duboisin noch nicht ausgesetzt war. Erst am 24./VI. trat wieder Verminderung ein. Patient noch in Behandlung.

25) Fuchs Therese, Blumenmacherin, 22 J. Beide Spitzen, besonders linke, gedämpft. Fieber mitunter sehr bedeutend. Am 12./XI. Duboisin gegen Nachtschweisse; da keine Wirkung eintrat, wurde am 16./XI. die Dosis verdoppelt, ebenso am 18./XI. Erst vom 26./XI. wurde der Schweiss geringer, und so blieb es, bis am 25./XII. wieder etwas bedeutenderer Schweiss auftrat, und nun nahm der Schweiss auf Duboisin nicht mehr sichtlich ab. Freilich starb Patientin schon einen Monat darauf (25./I.)

26) Bredel Adam, Bürstenmacher, 22 J. Rechte obere Lungenparthie intensiv gedämpft. Anfangs fieberlos. Am 23./IX. wurde Duboisin ordinirt. Die Schweisse nahmen sehr ab und verschwanden zeitweilig ganz, erst am 28./X. trat wieder Nachtschweiss auf. Duboisin repetirt, blieb jedoch, da unterdeß auch continuirliches Fieber eingetreten war, völlig wirkungslos, weshalb es nach einiger Zeit ausgesetzt wurde.

27) Pohl Jos., Tagelöhner, 40 J. Leichte Dämpfung beider Spitzen, hohe Temperatur, große Schweisse, welche stark übelriechen. Deshalb am 20./II. 2 Pillen Duboisin. Doch die Schweisse waren noch am 24./II. trotz Duboisin sehr stark, deshalb wurde am 25./II. 3 Pillen Duboisin täglich verordnet. Aber trotz der dreifachen Dosis blieben die Schweisse sehr stark. Der phthisische Proceß machte unterdeß rapide Fortschritte, und Patient starb schon einen Monat darauf.

28) Schuster Gelafius, Fuhrknecht, 32 J. Beide Spitzen, besonders linke, gedämpft, mäßiges Fieber. Am 27./II. sehr starke Nachtschweisse, deshalb 2 Pillen Duboisin. Trotz Duboisin nach wie vor starke Schweisse, so daß am 7./III. Duboisin wegen Nutzlosigkeit ausgesetzt wurde. Patient erlag am 16./III. der Krankheit.

29) Gramer Fr., Buchhalter, 32 J. Rechte Spitze gedämpft, mäßiges Fieber, nur zeitweise hoch, beträchtliche Macies. Am 27./II. sehr starke Schweisse, deshalb vom folgenden Tage an 2 Pillen Duboisin, doch war die Wirkung auf die Schweisse gleich Null. Freilich starb schon Patient am 3./III.

30) Schlemmer Benno, Dienstmann, 42 J. Linker Oberlappen infiltrirt, mäßiges Fieber. Am 31./I. Duboisin gegen starke Nachtschweisse, welche sich etwas verminderten, doch unbedeutend. Patient hatte ordentliche Schlaffucht (ob dies Phaenomen auf Duboisin zurückzuführen?) Die Schweisse traten wieder stark auf und Duboisin blieb unwirksam. Der Zerfall in der linken Lunge machte rasch Fortschritte und Patient erlag am 25./III.

31) Braumandl Ign., Schreinergehilfe, 42 J. Cirrhose.

der linken Lungen spitze, allgemeine Tuberculose, hohes Fieber. Am 10./III. 2 Pillen Duboisin gegen Nachtschweisse. Es trat keine Schweissverminderung ein, am 19./IV. erfolgte der Tod.

32) Hemaue Xav., Schneidergehülfe, 32 J. Beide Spitzen ergriffen, rechte in stärkerem Grade. Larynxphthise. Geringes Fieber. Am 14./VI. erhielt Patient Duboisin gegen nächtliche Schweisse. Die Schweisse nahmen bis jetzt (25./VI.) nicht bedeutend ab.

Soweit die Fälle, die nur mit Duboisin behandelt wurden; interessant dürfte es sein, noch einige Fälle damit zu vergleichen, die abwechselnd mit Atropin und Duboisin behandelt wurden.

1) Glas Franc., Zugeherin, 17 J. Beide Spitzen, bef. linke, weit hinab gedämpft, ziemlich hohes Fieber, profuse Tag- und Nachtschweisse. Deshalb wurde am 29./II. dagegen Atropin gereicht, doch keine Verminderung derselben erzielt. Am 3./III. trat tuberculöse Peritonitis hinzu. Da Atropin keine Abhülfe schaffte, wurde am 7./III. Duboisin versucht. Am folgenden Tage trat Pneumothorax ein, die Schweisse bestanden aber fort. Am 26./III. erfolgte der Tod.

2) Weifsmann Marg., Tagelöhnerin, 52 J. Linker Oberlappen ergriffen, geringes Fieber, hochgradige Macies. Am 30./V. wurde gegen die lästigen Nachtschweisse Atropin verordnet, zu 0,0004 und so fortgefahren bis 7./VI., in welcher Zeit eine Verringerung der Schweisse zu constatiren war. Da jedoch dieselben wieder heftig auftraten, gab man vom 17./VI. Duboisin zu 0,0005. Auch hierauf verminderten sich die Schweisse, doch vom 28./VI. traten sie wieder heftig auf, besonders des Morgens, trotzdem das Fieber gering war. So wurde nun Duboisin vom 6./VII. an in verdoppelter Dosis gegeben (0,001), doch die Schweisse wichen nun nicht mehr der Medication, und unter zunehmender Schwäche starb Patientin 23./VII.

3) Kleinle Ulrich, Tagelöhner, 30. J. Beide Lungen spitzen

gedämpft, besonders links mit großer Caverne, fast continuirlich hohes Fieber. Vom 3./XII. traten bedeutende Nachtschweisse auf, und es wurde daher am 11./XII. Duboisin verordnet. Trotz des Duboisin verblieb die Schweisssecretion auf der früheren Höhe, darum wechselte man am 24./XII. mit Atropin ab, und an den folgenden Tagen war der Schweiß geringer, allerdings war gerade an diesen 2 Tagen die Temperatur am niedrigsten (38,7); schon vom 26./XII. an stieg die Temperatur wieder zur alten Höhe und mit ihr auch die Schweisse, trotzdem vom 28./XII. 2 Atropinpillen gegeben wurden. Erst am 3./I. war wieder etwas Verminderung zu constatiren. Da nun auch der phthisische Process besonders links rapide fortschritt mit Bluthusten, traten vom 5./I. wieder enorme Schweisse auf und blieben bestehen trotz Atropin.

4) Tisch Mich., Handelsmann, 38 J. Beide Oberlappen infiltrirt, rechts mit Caverne. Mässiges Fieber. Am 9./IV. Atropin gegen Nachtschweisse, welche jedoch nicht abnahmen; darauf wurde am 12./IV. mit Duboisin versucht und am 8./V. nochmals 10 Stück Duboisinpillen verabreicht. Doch beidesmal ohne Erfolg. Patient starb am 18./V.

5) Wimmer Joh., Dienstknecht, 30 J., trat mit Phthisis incipiens ein, die jedoch in letzter Zeit ziemlich rasch um sich griff und beide Oberlappen bis jetzt befiel. Mässiges Fieber. Am 17./V. bekam Patient gegen die starken Schweisse 2 Atropinpillen, die Schweisse wurden sehr wenig vermindert, traten jedoch bald wieder in aller Heftigkeit auf, worauf am 27./V. mit Duboisin, ebenfalls 2 Pillen pro dosi, abgewechselt wurde, doch ebenfalls ohne Erfolg bis jetzt. Patient noch in Behandlung.

6) Reith Therese, Kleidermacherin, 27 J. Beide Spitzen ergriffen, mässig hohes Fieber. Patientin magert enorm ab, bekam ein Exsudat im Becken. Verdacht auf tuberculöse Peritonitis. Da auch ungewöhnlich heftige Schweisse auftraten, bekam Patientin am 16./X. Abends 2 Atropinpillen. Am folgenden Tage waren die Schweisse geringer, doch am 18./X. wieder reichlich, worauf sie ein Extr. Belladonae bekam. Es war zwar am nächsten Tage

kein Schweiß vorhanden, doch trat leichte Intoxication auf. Vom 21./X. traten die Schweißse mit erneuter Heftigkeit auf, und erst vom 25./X. an wurden sie ohne Medication weniger profus. Am 9./XI., da die Schweißse wieder enorm waren, Duboisin versucht, und hierauf trat, so lange Duboisin gegeben wurde, erhebliche Verminderung derselben ein, so daß Duboisin nach kurzer Pause immer wieder repetirt wurde. Am 30./XI. wurden 2 Pillen Duboisin verabreicht, da es keine gute Wirkung zu verlieren schien, worauf in der folgenden Nacht kein Schweiß eintrat. Am Morgen klagte Patientin über Schwindelgefühl. Der Erfolg aber blieb ein guter, es war gar kein oder doch nur wenig Schweiß vorhanden. Am 8./XII. wurde wieder mit Atropin abgewechselt, doch mußte leider bald von Atropin wie Duboisin trotz der guten Wirkung auf die Beschränkung der Schweißse ganz abgesehen werden, da bedrohliche Intoxicationsercheinungen eintraten, Uebelkeit, Schwindel, heftiges Kopfweg, enorme Trockenheit im Halfe, großes Durstgefühl und Leibweh. Später trat tuberculöse Basilar meningitis hinzu, der Patientin schließlich erlag.

7) Führlbeck Ant., Köchin, 29 J. Beide Spitzen, besonders rechte, ergriffen, geringes Fieber, zeitweise hoch. Schweißse des Nachts und des Tags über. Am 11./VI. wurde Atropin gegeben, täglich 3 Stück (0,003). Trotzdem liefs die Schweißsecretion nicht nach. Freilich war um diese Zeit das Fieber gestiegen. Es wurde nun am 19./VI. mit Duboisin versucht und zwar 0,002 p. die. Am folgenden Tage war die Schweißsecretion noch ziemlich reichlich, doch vom 21. und besonders 22./VI. an liefsen die Schweißse nach, und als Patientin am 27./VI. gebessert entlassen wurde, waren die früher so profusen Schweißse doch ziemlich beträchtlich vermindert; auch das hohe Fieber hatte bedeutend nachgelassen.

8) Hacker Magd., Wittwe, 34 J. Beide Spitzen, besonders linke, gedämpft, mäfsiges Fieber, beträchtliche Macies. Am 25./IV. Atropin gegen Nachtschweißse, welche geringer wurden und vom 29./V. ganz abnahmen. Erst am 7./VI. trat wieder viel Nacht-

schweifs auf. Es wurde nun mit Duboisin versucht, worauf die Schweifse ebenfalls nachliessen und vom 9./VI. an ganz verschwanden. Patientin wurde am 13./VI. gebessert entlassen.

9) Kielinsky Joh., Hafnergehülfe, 46 Jahre. Linke Spitze gedämpft, mäfsiges Fieber. Am 21./V. 2 Pillen Atropin gegen die Nachtschweifse, doch ohne Erfolg. Es wurde nun am 27./V. mit Duboisin versucht, 2 Pillen. Der phthifische Procefs machte unterdefs Fortschritte. Am 29./V. wurden 3 Pillen Duboisin gegeben (0,0015). Es schien, als ob Duboisin wirksam wäre, an einigen Tagen waren die Schweifse etwas geringer, doch bald traten sie in aller Heftigkeit wieder auf und blieben trotz 3 Duboisin-Pillen bis jetzt bestehen. Patient noch in Behandlung.

Werfen wir zunächst einen Blick zurück auf die 32 Fälle, welche lediglich mit Duboisin behandelt wurden, so drängt sich uns beim Lesen der Krankengeschichten sofort die Ueberzeugung auf, dafs nach Duboisin der Erfolg häufig inconstant ist und erst nach längerem Gebrauch eintritt, ferner dafs die Besserung nach Aussetzen des Mittels schneller schwindet und eine raschere und öftere Wiederholung nöthig macht; Erfolge, wie sie nach Atropin erzielt wurden, dafs nach der ersten oder zweiten Dosis die Schweifse prompt sistirten, sind hier nicht beobachtet worden.

Die Erfolge, die mit Duboisin erzielt wurden, lassen sich nicht so gut in Zahlen ausdrücken, als es beim Atropin der Fall war, weil häufig nach vorübergehender Wirkung beim Fortschreiten des phthifischen Proceßes weitere Darreichung des Duboisin ohne Erfolg blieb, häufig die Wirkung inconstant war, weshalb die Rubricirung derartiger Fälle erschwert ist. Doch sei eine ungefähre Vergleichung der Erfolge wie Misserfolge in Zahlen hier angeschlossen: Von gutem Erfolge, d. h. völliges Aufhören der Schweifssecretion bewirkend, freilich erst nach längerer Darreichung, war Duboisin eigentlich nur bei 6 Fällen. Von diesen 6

Fällen war nur ein einziger fieberlos, und der Intensität des phthitischen Processes nach gehören an: ein Fall der beginnenden Phthise, die freilich so rasch sich ausbreitete, daß in kurzem der Tod erfolgte, 3 Fälle der Spitzeninfiltration, d. h. der Phthise mittleren Grades, 2 Fälle etwas vorgeschrittener Phthise; ferner endigte die Hälfte dieser Fälle mit Tod, die 2 vorgeschrittenen Phthisen und die anfängliche Phthisis incip. mit ausgesprochen käfigem Charakter. Von theilweisem Erfolge, d. h. mehr weniger Verminderung der Schweisssecretion begleitet war der Gebrauch des Duboisin bei 18 Fällen, worunter 3 Phthisis incipientes, von denen freilich ebenfalls eine mit akuter Verkäufung und Zerfall mit dem Tode abging; 7 Spitzeninfiltrationen, von denen 3 starben; 8 mehr weniger vorgeschrittene Phthisen, von denen 5 letal endigten. Fieberlos war nur eine beginnende Phthise, alle andern waren mit mehr weniger hohem Fieber verbunden und die meisten Fälle gehörten unter die Kategorie der mehr käfigen Pneumonien mit Zerfall. Nutzlos entweder von vornherein oder nach einem anfänglichen Erfolge war Duboisin bei 8 Fällen, von denen 6 Phthisen mittleren Grades, 1 Fall eine vorgeschrittene Phthise und einer eine Cirrhose mit nachfolgender allgemeiner Tuberculose waren; dem Tode erlagen im Ganzen 6 davon.

Siehe Tabelle pag. 48.

Interessant ist die öfter gemachte Beobachtung, daß bei einem geringen Fieberzustande Duboisin ganz gut wirkte; sobald aber die Temperatur stieg, war die Wirkung sehr inconstant. Auch hier haben wir ausreichend Gelegenheit, mehr noch, als bei den mit Atropin behandelten Fällen, die Thatfache zu constatiren, daß die Schweisse bedeutend hartnäckiger sind bei den mehr käfigen phthitischen Processen.

Vergleichen wir nun mit unseren Ergebnissen die Resultate Fräntzels. Fräntzel gebrauchte Duboisin in 13 phthitischen Fällen und erzielte bei 10 Fällen völliges Aufhören der Schweisse, wenn auch nach längerer Anwendung, bei 2 Fällen nur Ver-

	mit Erfolg	mit theilweisem Erfolg	ohne Erfolg
Im Ganzen 32 Phthifien	6	18	8
Phthifis incip.	1	3	—
Spitzeninfiltrationen	3	7	6
Vorgeschrittene Phthifien	2	8	2
Mit tödtlichem Ausgange	3	9	6
Fieberlos	1	1	—
In Procent	18 ³ / ₄ %	56 ¹ / ₄ %	25%

minderung und bei einem Falle war Duboisin nutzlos und mußte wegen hochgradiger Nebenerscheinungen als Delirien etc. ausgesetzt werden. Freilich sind die Fälle Fräntzel's sämmtlich leichter Natur und in den ersten Stadien befindlich, nur 2 sind vorgeschrittene Phthifien und nur eine mehr käfiger Natur. Vergleicht man damit unsere Fälle, dann ist die Mehrzahl davon von ausgesprochen käfigem Charakter; endigten ja auch von diesen 32 Fällen 18, also mehr als die Hälfte, bald mit dem Tode. Es lassen sich darum stricte unsere Fälle nicht gut mit denen Fräntzel's vergleichen, abgesehen, daß auch deren Anzahl zu klein ist, denn unzweifelhaft geht aus all' den Krankengeschichten, sowohl die mit Atropin als die mit Duboisin behandelt wurden, hervor, daß Phthifien mit vorwiegend käfigem Charakter ungünstigere Objecte in Bezug auf die Schweissbeschränkung darbieten, als mehr chronisch verlaufende und in den ersten Stadien der

Krankheit befindliche. Zur ferneren Illustrirung dieser Thatfache mögen auch die abwechselnd mit Atropin und Duboisin behandelten Fälle dienen. Im Ganzen sind es 9 Fälle, von denen 6 ausgesprochen käfig, resp. mehr weniger acut sind. In allen diesen 6 Fällen, von denen 4 mit dem Tode abgingen, 1 trotz hochgradiger Schwäche entlassen wurde und 1 noch in Behandlung steht, war Atropin wie Duboisin nur einmal von ausgesprochenem Erfolge begleitet, indem die Schweisse beträchtlich abnahmen, doch mußten leider beide Mittel wegen hochgradiger Nebenerscheinungen ausgesetzt werden (Reith), in den übrigen 5 Fällen war die Anwendung beider Alcaloide nutzlos, einmal nach anfänglichem Erfolge seitens des Atropin wie Duboisin, einmal nach vorübergehendem Erfolge von Atropin, während Duboisin ganz unwirksam geblieben.

Die übrigen 3 Fälle sind Spitzeninfiltrationen mehr weniger großer Ausdehnung. In einem Falle (Hacker) war Atropin wie Duboisin von bester Wirkung, d. h. die Schweisse verschwanden nach und nach gänzlich, in einem weiteren Falle (Führbeck) war nach nutzloser Anwendung des Atropin Duboisin von Wirkung, indem wenigstens theilweise die Schweisse abnahmen, und im letzten Falle war weder Atropin, noch Duboisin von sichtlichem Erfolge begleitet.

Diese letzteren 9 Fälle bekunden zur Genüge, daß in gewissen, früher näher präcisirten Fällen beide Mittel unwirksam sind, anderseits aber wieder beide von bestem Erfolge begleitet sind und in einer dritten Reihe von Fällen die Wirkung beider constant ist, indem bald nur das eine oder bald nur das andere vorübergehend Besserung schafft. Diese Bemerkung leitet uns unwillkürlich über zu einer Vergleichung der Erfolge beider Alcaloide, obwohl jede Vergleichung ihr Mißliches hat, da ja kein Fall einem andern gleich verläuft, und jede Individualität ihr Besonderes darbietet und selbst da, wo bei einem Falle beide Mittel nach einander angewendet wurden, doch die Verhältnisse fortwährend sich verändern und zu keiner Zeit gleich

find. Es wird sich also nur darum handeln, welch' allgemeinen Eindruck man von der Wirkung beider Mittel sich gebildet hat.

Zur Vergleichung wollen wir die Zahl der Atropinbehandlungen mit denen der Duboisinbehandlung zusammenstellen:

Mit Atropin wurden behandelt mit Erfolg	40 ⁰ /0
mit theilweisem Erfolg	42 ⁶ /7 ⁰ /0

Summa	. 82 ⁶ /7 ⁰ /0.
-------	---------------------------------------

Mit Duboisin wurden behandelt mit Erfolg	18 ³ /4 ⁰ /0
mit theilweisem Erfolg	56 ¹ /4 ⁰ /0

Summa	. 75 ⁰ /0.
-------	-----------------------

Es bleiben ohne Erfolg seitens des Atropin 17¹/7⁰/0,

„ „ „ „ „ „ Duboisin 25⁰/0.

Was die mit vollständigem Erfolg behandelten Fälle anlangt, so scheint das Duboisin gar sehr dem Atropin nachzustehen; die Summen der relativen Erfolge allerdings decken sich so ziemlich, 82⁶/7⁰/0 und 75⁰/0; und die Zahl der ohne Erfolg behandelten Phthifien ist beiderseits sehr gering im Vergleich zu den Misserfolgen früherer Behandlungsweisen der phthifischen Schweisse. Man vergesse aber bei diesem Vergleiche keineswegs, daß die mit Duboisin behandelten Fälle zufällig fast alle schwerere, d. h. mehr weniger acut käfige Fälle waren. Denn vergleichen wir die beiderseits mit dem Tode abgegangenen Phthifien, so fällt das günstigere Verhältniß auf die Seite des Atropin.

Von 35 mit Atropin behandelten Fällen starben im Ganzen 9, d. h. 25⁵/7⁰/0, von 32 mit Duboisin behandelten dagegen 18, d. h. 56¹/4⁰/0. Auch schon ein flüchtiger Blick über beide Reihen von Krankengeschichten überzeugt uns von der schwereren Natur der Erkrankungen auf Seite des Duboisin. Bringen wir dies in Anrechnung, so machen wir wohl keinen zu großen Fehler, wenn wir die ohne jeden Erfolg behandelten Fälle als beiderseits ziemlich gleich ausfallend annehmen. Trotzdem aber, daß Duboisin selbst in Fällen wirkt, wo Atropin unwirksam geblieben, können wir uns doch nicht verhehlen, daß Atropin prompter und constanter

wirkt; und ich kann im Allgemeinen dem *Resumé Fräntzel's* nur beistimmen, welcher den mit *Duboisin* erzielten Erfolg dahin präcificirt ¹⁾: „Jedenfalls steht der mit dem *Duboisin* erzielte Erfolg dem des *Atropin* weit nach, weil 1) die Wirkung selten eine prompte war, meist erst nach mehreren Tagen eintretend, 2) gelang es nicht immer, die Schweisse zu unterdrücken.“ Nur den dritten Punkt, daß *Nebenerscheinungen* häufig waren, muß ich nach den hier gemachten Beobachtungen direct verneinen. Die *Nebenerscheinungen* waren nicht häufiger als bei *Atropin*, ja es gewinnt fast den Anschein, als ob sie nach *Duboisin* seltener eintreten. Wenigstens in den mir zur Verfügung stehenden Krankengeschichten und den von mir selbst beobachteten Fällen waren außer 4 Fällen keine *Nebenerscheinungen* erheblicherer Natur zu constatiren. Etwas Trockenheit im Halse, häufig mäfsig weite, aber gut reagirende Pupillen sind, als die Aussetzung des *Duboisin* nicht indicirend, unerwähnt geblieben. Die etwas erheblicheren *Nebenerscheinungen* sind analog den bei *Atropin* beobachteten, nur einmal ist Schlaffucht auf *Duboisin*gebrauch vielleicht zurückzuführen. Nach dem Recepte, welches Fräntzel angibt, scheint er das reine Alkaloid gebraucht zu haben, vielleicht beruht darauf die Heftigkeit und Häufigkeit der von ihm beobachteten *Nebenerscheinungen*. Im hiesigen Krankenhause, II. med. Abth., wird das schwefelsaure *Duboisin* zu 0,0005—0,001 pro dosi in Pillenform angewendet und trotzdem daß häufig 3 Pillen (0,0015) gegeben wurden, ist eine schwerere Intoxication, wie sie doch nach den Angaben so vieler Autoren, nach denen *Duboisin* bedeutend energischer wie *Atropin* wirken solle, eintreten mußte, niemals gesehen worden.

Was die allgemeinen Indicationen und Contraindicationen im Gebrauch des *Duboisin*, sowie dessen Anwendungsweise betrifft, so gilt daselbe wie vom *Atropin*.

Immerhin, mag nun *Duboisin* wirklich unzuverlässiger als *Atropin* in seiner Wirkung sein, haben wir doch auch in diesem

¹⁾ Separat-Abdruck aus d. *Charité-Annalen*, Jahrg. VI. S. 1—6.

neuen Alcaloide ein brauchbares Mittel zur Beschränkung profuser pathologischer Schweisssecretion im Vergleich zu der Legion der früher dagegen vergeblich angewandten gefunden, und es wird sich immer der Mühe lohnen, in Fällen, wo Atropin im Stiche läßt, einen Versuch mit Duboisin zu machen.

Zum Schlusse sei dem Herrn Director Professor v. Ziemssen für die bereitwillige und freundliche Ueberlassung des Materials, sowie für die Benützung der Bibliothek mein bester und herzlichster Dank gesagt.
